

**Дифференцированный зачет
по дисциплине «Основы сестринского дела»
Специальность 33.02.01. Фармация**

Дифференцированный зачет проводится в форме тестирования.

Примерный вариант

1. Наиболее восприимчивыми к внутрибольничной инфекции являются пациенты:
 - а) терапевтических отделений,
 - б) хирургических и урологических отделений,
 - в) неврологических отделений.

2. Показатели вспышки ВБИ:
 - а) сезонность и периодичность;
 - б) количество заболевших;
 - в) тяжесть заболевания.

3. Распространению ВБИ способствует:
 - а) слабая материально-техническая база ЛПУ;
 - б) инвазивные лечебные и диагностические процедуры;
 - в) плохое снабжение лекарствами;
 - г) тяжесть заболевания.

4. Известно, что персонал нередко (50-60% случаев) является носителем золотистого стафилококка, причем чаще всего носителями являются:
 - а) мужчины,
 - б) женщины.

5. По мнению ряда исследователей, основная часть бактерий попадает в воздух перевязочных и операционных:
 - а) из носоглотки
 - б) с поверхности кожи.

6. Концентрация рабочего раствора хлорамина для обработки рабочих поверхностей процедурного кабинета в случае загрязнения кровью
 - а) 3%.
 - б) 1%.
 - в) 0,5%.
 - г) 0,25%.

7. Раствор для обработки полости рта при попадании биологической жидкости ВИЧ-инфицированного пациента
 - а) 70% этиловый спирт.
 - б) 96% этиловый спирт.

- в) Протаргол.
- г) Альбуцид.

8. Срок сохранения стерильности бикса с фильтром:

- а) 7 суток.
- б) 20 суток
- в) 24 часа.
- г) в течение рабочего дня

9. Раствор, применяемый для обработки кожи медсестры при попадании крови ВИЧ-инфицированного пациента

- а) этиловый спирт.
- б) сульфацил натрия.
- в) борная кислота.
- г) фурацилин.

10. Режим стерилизации, используемый для резиновых изделий:

- а) 2 атм, 132*С, 20 минут.
- б) 1,1 атм, 120*С, 45 минут
- в) 1,1 атм, 120*С, 60 минут
- г) 180*С, 60 минут

11. Показаниями для постановки горчичников являются:

- а) _____
- б) _____
- в) _____
- г) _____

12. Противопоказаниями для постановки горчичников являются:

- а) _____
- б) _____
- в) _____
- г) _____
- д) _____

13. Возможными осложнениями при постановке горчичников могут быть:

- а) _____
- б) _____

14. Области наложения горчичников:

- а) _____
- б) _____
- в) _____
- г) _____
- д) _____

15. Показаниями для подачи пузыря со льдом являются:

- а) _____
- б) _____
- в) _____
- г) _____

16. Для очистительной клизмы нужно приготовить:

- а) кружку Эсмарха и наконечник,
- б) резиновый баллон,
- в) шприц Жанэ,
- г) два толстых желудочных зонда и воронку.

17. Для постановки сифонной клизмы необходимо приготовить:

- а) кружку Эсмарха и наконечник,
- б) резиновый баллон,
- в) два желудочных зонда, соединенных стеклянной трубкой, с воронкой,
- г) два резиновых зонда, соединенных стеклянной капельницей

18. Эффект действия масляной клизмы через ___ - ___ часов.

19. Объем масляной клизмы составляет _____ - _____ мл.

20. Температура лекарственного раствора для микроклизмы ___ - ___ С.

21. Наконечник при постановке масляной клизмы вводят на глубину ___ - ___ мл

22. Объем гипертонического раствора для микроклизмы ___ - ___ мл

23. Для обработки резиновых ковриков, пузырей для льда применяют раствор хлорамина:

- а) 2 %
- б) 3 %
- в) 0,5 %
- г) 1%.

24. Наиболее чувствительный орган к недостатку кислорода:

- а) спинной мозг
- б) головной мозг
- в) печень
- г) почки

25. При катетеризации у женщин катетер вводят на глубину (в см)

- а) 6-8
- б) 3-5
- в) 15-20
- г) 10-12

26. При спастических запорах у пациента чаще назначается клизма

- а) обычная очистительная т воды -25гр
- б) обычная очистительная т-воды 42гр
- в) сифонная
- г) гипертоническая

27. Формула определения глубины введения желудочного зонда при промывании желудка (в см)

- а) рост — 50
- б) рост — 80
- в) рост —100
- г) рост — 1/2 роста

28. Максимальное время использования газоотводной трубки (в часах)

- а) не более 3
- б) 3
- в) 1
- г) 0,5

29. Стерильная посуда необходима при сборе:

- а) кала на яйца гельминтов
- б) кала на простейших
- в) мокроты на атипические клетки
- г) мазка из зева

30. Противопоказанием к постановке очистительной клизмы является

- а) кишечное кровотечение
- б) метеоризм
- в) подготовка к родам
- г) отсутствие стула более двух суток (запор)

31. Для разведения 100 000 ЕД пенициллина необходимо взять растворителя:

- а) 1 мл
- б) 2,5 мл
- в) 5 мл
- г) 10 мл

32. Тяжелая форма аллергической реакции пациента на введение лекарственного вещества

- а) крапивница
- б) отек Квинке
- в) анафилактический шок
- г) покраснение

33. Количество дыханий в одну минуту у взрослого в норме:

- а) 40-60

- б) 22 - 28
- в) 30 - 36
- г) 16-20

34. К свойствам пульса относится все, кроме:

- а) типа
- б) частоты
- в) наполнения
- г) напряжения

34. Максимальное АД - это:

- а) систолическое
- б) диастолическое
- в) артериальное
- г) пульсовое давление

35. Угол наклона иглы при внутривенной инъекции (в град.)

- а) 5
- б) 45
- в) 90
- г) не имеет значения

36. Укажите глубину введения иглы при проведении внутримышечной инъекции:

- а) только срез иглы
- б) на всю длину иглы
- в) в зависимости от расположения сосуда
- г) две трети иглы

37. Каким способом чаще всего вводятся антибиотики:

- а) подкожно
- б) внутримышечно
- в) внутривенно
- г) внутривенно

38. Укажите положение больного во время внутримышечной инъекции в ягодицу:

- а) лежа на животе, на боку
- б) сидя
- в) стоя
- г) лежа на спине

39. Наиболее частым местом внутримышечного введения лекарственных препаратов является:

- а) подлопаточная область
- б) внутренняя поверхность предплечья
- в) передняя брюшная стенка
- г) дельтовидная мышца

40. Под каким углом (в град.) вводится игла при внутримышечной инъекции:

- а) 90
- б) 60

в) 45

г) 5

41. Укажите возможное осложнение при внутримышечной инъекции:

а) инфильтрат

б) воздушная эмболия

в) тромбофлебит

г) кровотечение

42. Назовите длину иглы для внутримышечной инъекции (в мм):

а) 60

б) 40

в) 30

г) 10

43. Какое количество (в мл) лекарственного вещества можно вводить внутримышечно:

а) 2-10

б) 4-6

в) 2-4

г) 1-2

44. С целью удаления корочек из носовой полости используется:

а) вазелиновое масло

б) 10 % камфорный спирт

в) 1 % салициловый спирт

г) 3 % перекись водорода

45. В случае, когда невозможно или затруднено питание пациента через рот, организуют:

а) ограниченное питание

б) естественное питание

в) рациональное питание

г) искусственное питание

46. Предметы ухода, необходимые для искусственного кормления:

а) дуоденальный зонд

б) одноразовая капельница

в) поильник

г) резиновая груша с наконечником

47. При заболеваниях печени назначается диета №:

а) 5

б) 3

в) 10

г) 13

48. Растворитель антибиотиков:

- а) 10% хлорид натрия
- б) 5% глюкоза
- в) 5% новокаин
- г) 0,5% новокаин

49. Диета № 9 назначается при:

- а) сахарном диабете
- б) ожирении
- в) желтухе
- г) инфаркте

50. Основной признак I периода лихорадки:

- а) озноб
- б) жажда
- в) чувство жара
- г) рвота