

Базовые тестовые задания для подготовки к итоговой аттестации по программе профессиональной переподготовки по специальности «Общая практика»

Разъяснения: Правильные ответы помечены знаком *. В контрольные варианты тестов из представленного перечня будут выбраны вопросы в произвольном порядке. Расположение правильных ответов в разных вариантах контрольных тестов может меняться!

Физическое лицо, которому оказывается медицинская помощь:

больной человек

*пациент

старый человек

гражданин

Доступность и качество медицинской помощи в РФ обеспечиваются:

*наличием необходимого количества медицинских работников

муниципальным управлением здравоохранением

функционированием частной системы здравоохранения

государственным управлением здравоохранением

При отморожениях в скрытый период необходимо

*наложить теплоизолирующую асептическую повязку

наложить окклюзионную повязку

приложить холод до поступления в медицинское учреждение

наложить давящую повязку

На сортировочном посту личный состав работает с использованием средств индивидуальной защиты

защитная одежда и приборы дозиметрического контроля

защитная одежда, перчатки, очки

защитная одежда, перчатки, щитки

*респираторы, резиновые перчатки, защитная одежда и приборы дозиметрического контроля

Патологическое урежение дыхания:

*брадипноэ

тахипноэ

апноэ

диспноэ

К факторам риска развития неинфекционных заболеваний относится

*артериальная гипертензия

дисфагия

дизурия

анемия

Люди, погибшие или пропавшие без вести при возникновении ЧС – это:

ситуационно-обусловленные потери

общие потери

санитарные потери

*безвозвратные потери

Совокупность норм поведения медицинского работника и их регулирование в процессе оказания медицинской помощи – это:

сестринские технологии

сестринское дело

деонтология

*медицинская этика

При диспансеризации больных хроническим холециститом проводят

цистоскопию

УЗИ брюшной полости

Урографию

лапароскопию

Среди причин смерти при катастрофах на первом месте находится:

*травма не совместимая с жизнью
травматический шок
острая кровопотеря
психотравма

Оптимальным сроком оказания первой помощи пострадавшим принято считать с момента поражения:

3 часа
6 часов
1 час
*20-30 минут

К видам паллиативной помощи относится:

диспансеризация
скорая помощь
*консультативная помощь
радикальная операция

Санаторно-курортное лечение включает медицинские профилактические, лечебные и реабилитационные мероприятия на основе:

*природных лечебных ресурсов
лекарственной терапии
гомеопатии
иглоукалывания

Первая помощь, до оказания медицинской помощи, оказывается гражданам при угрожающих их жизни и здоровью:

развлекательных мероприятиях
террористических актах
*несчастных случаях, травмах, отравлениях, состояниях и заболеваниях
травмах

При приступе бронхиальной астмы выделяется:

*небольшое количество вязкой стекловидной мокроты
мокрота в виде «малинового желе»
«ржавая» мокрота
большое количество гнойной мокроты

В медико-социальной помощи в первую очередь нуждаются

практически здоровые лица
часто болеющие острыми респираторными заболеваниями
дети со сниженным иммунитетом
*инвалиды

При составлении пищевого рациона пациенту с гипертонической болезнью рекомендуют:

*ограничить употребление соли и жидкости
ограничить употребление рафинированных углеводов
усилить питание
ограничить употребление животных жиров

К группе лекарственных препаратов, обладающих гепатопротекторным действием относится:

дротаверин (но-шпа)
панкреатин (фестал)
мебеверин (дюспаталин)
*эссенциале

Для смены постельного белья продольным способом пациенту, находящемуся на строгом постельном режиме, придают положение:

*на боку
«Симса»
на животе
на спине

Неоказание помощи больному без уважительных причин лицом, обязанным ее оказывать в соответствии с законом, если оно повлекло смерть или причинение тяжкого вреда здоровью больного, влечет за собой:

выговор

увольнение

*лишение права заниматься профессиональной деятельностью и свободы

замечание

При подозрении на лейкоз необходима консультация врача:

онколога

кардиолога

*гематолога

терапевта

В норме индекс массы тела составляет

35,0 кг/м² -39,9 кг/м²

18,5 кг/м² – 24,9 кг/м²

25,0 кг/м² -29,9 кг/м²

30,0 кг/м² -34,9 кг/м²

При подозрении на меланому необходима:

*консультация врача-онколога

диатермокоагуляция

обработка кожи 10% настойкой йода

криодеструкция

Наиболее часто инвалидность наступает вследствие

общего заболевания

трудового увечья

врожденной патологии

профессионального заболевания

При подготовке пациента к ректороманоскопии или колоноскопии медицинская сестра должна выполнить назначение:

*очистительную клизму накануне и за 2 часа до исследования

масляная клизма утром

сифонная клизма вечером

сифонная клизма за 2 часа до исследования

Правовое регулирование проявляется в государственном воздействии на тот или иной процесс с использованием:

норм морали

религиозных норм

социальных норм

*норм права

Сбор кала для копроскопии рекомендуется после

клизмы

специальной диеты

*естественной дефекации

приема слабительных

Неэффективные реанимационные мероприятия продолжаются:

2 часа

15-20 минут

*30 минут

3-6 минут

К основным симптомам гипогликемического состояния относятся:

одышка, сухой кашель

боли в области сердца, одышка

отеки, головная боль

*чувство голода, потливость

Основные показатели, характеризующие качество организации диспансеризации

число больных, выявленных в ранних стадиях, число вновь выявленных больных, длительность диспансерного наблюдения

*полнота охвата диспансерным учетом, своевременность выявления заболеваний, своевременность взятия на диспансерный учет

своевременность выявления заболеваний и предупреждение их осложнений, правильность определения степени временной и стойкой потери трудоспособности

число зарегистрированных заболеваний в течение года, правильность определения степени временной и стойкой потери трудоспособности, своевременность предупреждения осложнений заболеваний

Положение пациента после успешной реанимации, при ожидании бригады скорой медицинской помощи

на животе лицом вниз

*устойчивое боковое положение

положение на спине с приподнятыми ногами

положение Трендэленбурга

Изотонический раствор хлорида натрия имеет концентрацию:

1%

0,1%

10%

*0,9%

Бледность кожных покровов наблюдается при:

острой печеночной недостаточности

отравлении угарным газом

*острой массивной кровопотере

острой почечной недостаточности

Мероприятия при обзорном осмотре пострадавшего для выявления и временной остановки наружного кровотечения включают:

только максимальное сгибание конечности в суставе

иммобилизацию конечности

наложение асептической повязки

*пальцевое прижатие артерии, наложение жгута, давящей повязки

Критерием эффективности закрытого массажа сердца является:

восстановление сознания

повышение температуры тела

*порозовение кожных покровов

повышение АД

Прием Геймлиха при инородном теле в гортани представляет собой:

сочетание искусственной вентиляции легких с непрямой массажем сердца

введение воздуховода

*серию из 5 толчков кулаком на область верхней половины живота с целью удаления инородного тела из верхних дыхательных путей

запрокидывание головы и открывание рта

Оптимальный срок оказания доврачебной помощи пострадавшему с момента поражения:

*1-2 часа

3 часа

не более 6 часов

4 -5 часов

Первая помощь при отморожении I степени:

*переодеть в сухую одежду

наложить повязку с фурациллином

обезболить

успокоить пострадавшего

Санаторно-курортное лечение противопоказано при заболеваниях органов ЖКТ

хронический колит
хронический неактивный гепатит
*язвенная болезнь желудка в стадии обострения
гастрит

Мешок «АМБУ» используется для:

сбора отходов класса Б
*проведения искусственной вентиляции легких
проведения непрямого массажа сердца
сбора отходов класса А

Одна из самых эффективных техник межличностного общения с пациентами, коллегами, студентами, родственниками – это техника:

*активного слушания
контраргументации
аргументации
ориентировки в собеседнике

Для проведения дополнительного обследования пациентов в Центре (отделении) общей врачебной практики функционирует

микробиологическая лаборатория
флюорографический кабинет
кабинет лучевой диагностики
*клинико-диагностическая лаборатория

Подготовка пациента к рентгенологическому исследованию пояснично-крестцового отдела позвоночника включает:

введение газоотводной трубки
*постановку очистительной клизмы и ограничение пищевого режима
проведения промывания желудка
рекомендации пациенту по отказу от курения перед исследованием

К физическому методу дезинфекции относится:

проветривание
вытряхивание
*кипячение
протираание

Одноразовые пакеты и емкости для сбора отходов класса Б имеют цвет:

*желтый
черный
красный
белый

При старении изменения системы мочевого выделения характеризуются:

повышением тонуса мочеточников
увеличением вместимости мочевого пузыря
*снижением почечного кровотока
более редким мочеиспусканием

Основной мерой профилактики заболеваний органов дыхательной системы у взрослого населения является:

*борьба с табакокурением
соблюдение принципов рационального питания
адекватная физическая нагрузка
борьба со стрессом

Вторичная профилактика онкологических заболеваний включает:

соблюдение диеты
регулярная физическая активность
*выявление и устранение предраковых заболеваний
нормализация массы тела

Ведущая роль в осуществлении диспансеризации населения принадлежит

*участковым терапевтам, педиатрам, семейным врачам
руководителям учреждений и организаций здравоохранения
ведущим специалистам базовых учреждений, руководителям предприятий
руководителям учреждений здравоохранения и семейным врачам

Модифицируемым (корректируемым) фактором риска развития заболеваний дыхательной системы чаще всего является:

гиподинамия
повышенные физические нагрузки
проживание в местности с хвойным лесом
*активное и пассивное курение

К факторам риска развития артериальной гипертензии относится:

низкое атмосферное давление
*стресс и психическое напряжение
прием снотворных
длительное переохлаждение

Первичная профилактика гипертонической болезни включает:

*формирование здорового образа жизни
предотвращение осложнений заболевания
предотвращение рецидивов заболевания
назначение белковой диеты

Обязательное медицинское страхование гарантирует:

*получение всеми гражданами РФ медицинской помощи определенного объема и уровня
выплату пособия в случае временной утраты трудоспособности
бесплатное получение гражданами высокотехнологичной дорогостоящей медицинской помощи
получение медицинской помощи минимального объема

Динамометрия оценивает:

количество шагов, сделанных в течение дня
продолжительность физической нагрузки
объем выдоха
*силу мышц

Уменьшение смертности и инвалидизации от онкологических заболеваний является целью:

третичной профилактики
социальной профилактики
*вторичной профилактики
первичной профилактики

Немодифицируемым фактором риска развития заболеваний дыхательной системы является:

респираторные заболевания
табакокурение
*наследственность
гиподинамия

При положительном результате анализа кала на скрытую кровь пациента направляют к врачу:

неврологу
оториноларингологу
*проктологу
офтальмологу

Первая помощь пациенту при инфаркте миокарда:

проводить в поликлинику на прием к участковому врачу
успокоить и уложить на правый бок, вызвать врача
*вызвать врача, уложить с приподнятым головным концом, обеспечить полный физический и психологический покой
вызвать врача, уложить с приподнятым ножным концом

Массовое заболевание, распространяющееся на несколько стран и континентов – это:

- эндемия
- спорадические заболевания
- эпидемия
- *пандемия

Врач и медицинская сестра общей практики осуществляют профилактику социально значимых болезней

- ревматизм, ревматоидный артрит
- вирусные гепатиты, циррозы печени
- бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких
- *туберкулез, артериальная гипертензия

Информация о проведении профилактического медицинского осмотра несовершеннолетних и его результаты вносятся в:

- маршрутную карту
- учетную форму № 25/у-04
- карту учета диспансеризации
- *паспорт здоровья

Гигиеническое воспитание – это:

- просветительная деятельность
- воспитательная деятельность
- обучающая деятельность
- *комплексная просветительная, обучающая и воспитательная деятельность

При ожирении двигательную активность рекомендуют:

- исключить
- *увеличить
- уменьшить
- не изменять

Маршрутная карта диспансеризации разработана для

- врача
- контролирующей организации
- *пациента
- медицинской сестры

Основным количественным критерием, характеризующим уровень здоровья нации, является:

- трудовой потенциал населения
- уровень детской смертности
- средняя продолжительность жизни
- *ожидаемая продолжительность жизни населения

Дезинфекция, проводимая в очаге в присутствии источника инфекции, называется:

- профилактическая
- физическая
- заклучительная
- *текущая

Уровень деkontаминации рук медсестры перед любой манипуляцией

- социальный
- профилактический
- хирургический
- *гигиенический

Краткое профилактическое консультирование проводится гражданам с группой здоровья:

- *I и II
- с любой группой здоровья
- I и IIIa
- I и IIIб

Забота о собственном здоровье является:

добровольным выбором гражданина
ответственностью человека перед обществом
личным делом каждого гражданина
*обязанностью граждан

Алая кровь выделяется пульсирующей струей при кровотечении:

капиллярном
венозном
*артериальном
паренхиматозном

Тримеперидин (промедол) – это:

*наркотический анальгетик
аналептик
психостимулятор
ненаркотический анальгетик

К важнейшим принципам охраны здоровья, согласно ФЗ РФ от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» относится:

медицинское страхование граждан
*соблюдение врачебной тайны
государственное управление здравоохранением
муниципальное управление здравоохранением

При атеросклерозе ограничивают продукты питания, содержащие:

витамин С
*жиры животного происхождения
калий
железо

В группу риска по развитию рака желудка, которая должна находиться под диспансерным наблюдением, входят пациенты

перенесшие острый гастрит в течении полугода от заболевания
*с хроническим атрофическим гипоацидным гастритом
имеющие родственников с диагностированным раком желудка
с синдромом Мелори

«Экстренное извещение» об инфекционном заболевании отправляется в:

дезинфекционную станцию
управление здравоохранения
*территориальный орган Роспотребнадзора
районную бактериологическую лабораторию

Для промывания желудка при пищевом отравлении применяется зонд:

*толстый
дуоденальный
тонкий
эндоскопический

Исследование кала на скрытую кровь при диспансеризации проводится гражданам начиная с возраста

55 лет
*40 лет
60 лет
35 лет

Показание к прекращению СЛР:

отсутствие признаков эффективного кровообращения
широкие зрачки
*появление признаков биологической смерти
отсутствие самостоятельного дыхания

Карманный ингалятор применяют пациенты с:

ринитом
гайморитом
*бронхиальной астмой
отитом

Маммография в рамках диспансеризации женщин проводится

*1 раз 2 года
1 раз в 3 года
ежегодно
1 раз в 5 лет

Для оформления и получения листка временной нетрудоспособности пациенту необходимо предоставить:

*паспорт
СНИЛС
медицинскую карту амбулаторного больного
полис ОМС

Медицинское освидетельствование на наличие или отсутствие ВИЧ-инфекции является обязательным для:
сотрудников организаций, осуществляющих образовательную деятельность

*доноров крови, биологических жидкостей, органов и тканей
всего медицинского персонала
специалистов любой профессии перед трудоустройством

Суточный диурез у взрослых составляет:

*от 800 мл до 2000 мл
от 2000 мл до 3000 мл
от 200 мл до 500 мл
от 500 мл до 800 мл

Количество дыхательных движений меньше 16 в минуту называется:

*брадипноэ
ортопноэ
тахипноэ
апноэ

Характер стула при желудочном кровотечении:

кровянистый
*дегтеобразный
обесцвеченный
«овечий кал»

Метеоризм – это:

задержка стула более чем на 48 часов
спастические боли в кишечнике
частый жидкий стул
*патологическое газообразование в кишечнике

В паллиативной медицинской помощи центральным элементом системы поддержки пациента и его семьи является:

духовный аспект
социальный аспект
реабилитационный аспект
*медицинский аспект

Наиболее эффективным средством контрацепции, защищающим от заболеваний, передающихся половым путем, является:

*презерватив
гормональные препараты
внутриматочная спираль
диафрагма

При беременности наиболее вероятно развитие анемии:

серповидно-клеточной
гемолитической
гипопластической
*железодефицитной

Отсутствие дыхания – это:

брадипноэ
диспноэ
*апноэ
тахипноэ

Обязательное медицинское страхование является:

системой, направленной на защиту прав медицинских работников
*составной частью государственной системы социального страхования
страхованием от несчастных случаев
системой, направленной на повышение размеров оплаты труда

Болевая, тактильная и температурная чувствительность у лиц пожилого и старческого возраста:

повышается
отсутствует
*снижается
не изменяется

Пораженные с тяжелыми и средней тяжести повреждениями, не представляющими непосредственной угрозы для жизни:

нуждаются в облегчении страданий
нуждаются в медицинской помощи по неотложным показаниям
не нуждаются в неотложной помощи
*нуждаются в медицинской помощи, но она может быть отсрочена

Оценка цвета кожных покровов производится

при искусственном освещении
в лучах люминисцентных ламп
используя рассеянный свет
*при дневном освещении (или лампах дневного света), при прямом и боковом освещении

Характерный симптом при атеросклерозе артерий нижних конечностей:

*перемежающаяся хромота
отеки
одышка
слабость

С целью повышения эффективности реабилитационных мероприятий медсестра общей практики должна

*обучать членов семьи пациента правильному уходу
оценить безопасность домашней обстановки
лично выполнять все манипуляции по уходу
ограничить контакты пациента с семьей

Возможное осложнение при проведении компрессий грудной клетки:

повреждение трахеи
*перелом ребер
перелом ключицы
перелом позвоночника

Пациенту с сахарным диабетом рекомендуется:

ограничить употребление солей
*ограничить употребление рафинированных углеводов
ограничить употребление жидкости
усилить питание

Право граждан РФ на охрану здоровья гарантируется:

Программой развития здравоохранения

Гражданским кодексом РФ

*Конституцией РФ и ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»

Трудовым Кодексом РФ

Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и признанные инвалидами вследствие общего заболевания проходят диспансеризацию

1 раз в 5 лет

*ежегодно

1 раз в три года

1 раз в два года

Неоказание помощи больному без уважительных причин лицом, обязанным ее оказывать в соответствии с законом, если оно повлекло смерть или причинение тяжкого вреда здоровью больного, влечёт за собой:

*лишение права заниматься профессиональной деятельностью и свободы

увольнение

замечание

выговор

Репродуктивный период в жизни женщины – это период:

полового созревания

угасания детородной функции

полового покоя

*наиболее благоприятный для зачатия, вынашивания и рождения ребенка

При подозрении на базалиому кожи необходима:

асептическая повязка

диатермокоагуляция

*консультация врача-онколога

смазывание ляписным карандашом

Задержкой стула считается его отсутствие в течение:

72 часов

36 часов

24 часов

*48 часов

Задача третичной профилактики:

предупреждение неблагоприятного влияния условий и образа жизни на здоровье

*максимальное восстановление качества жизни пациента

сохранение и развитие условий, способствующих улучшению здоровья

предупреждение прогрессирования заболевания

Предупреждение рецидивов онкологических заболеваний при диспансерном наблюдении является целью:

организации специализированной медицинской помощи

первичной профилактики

социальной профилактики

*вторичной профилактики

Наибольшее влияние на формирование здоровья населения оказывает

окружающая среда

генетический риск

*образ жизни населения

уровень и качество медицинской помощи

В ежедневном рационе содержание овощей и фруктов должно составлять:

до 400 гр

*не менее 400 гр

до 100 гр

300 гр

Диагностические критерии фактора риска «гиперхолестеринемия»:

повышенный уровень сахара в моче
повышенный уровень артериального давления
уровень глюкозы плазмы натощак 6,1 ммоль/л и более
*уровень общего холестерина 5 ммоль/л и более

Целевая аудитория при проведении третичной профилактики заболеваний:

*пациенты с хроническими формами заболеваний
выздоровливающие после перенесенных острых заболеваний
пациенты с факторами риска заболеваний
люди из групп риска

Продолжительность ежедневной физической нагрузки для профилактики гиподинамии – не менее:

15 минут
*30 минут
60 минут
20 минут

Физическая активность способствует:

перестройке жирового обмена в сторону увеличения содержания в организме жировой ткани
уменьшению потребности в пище
снижению приспособительных и компенсаторных реакций
*поддержанию обмена веществ на оптимальном уровне

Пациент – это:

*физическое лицо, которому оказывается медицинская помощь
человек, нуждающийся в социальной защите
родственник больного человека
посетитель медицинской организации

Самым здоровым сном является сон в период:

*22.00 – 06.00
01.00 – 03.00
00.00 – 04.00
03.00 – 06.00

Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи (ИСМП), развиваются только при наличии:

источника инфекции
*источника инфекции, факторов передачи, восприимчивого человека
источника инфекции, механизмов и факторов передачи
источника инфекции и восприимчивого человека

Полное уничтожение микроорганизмов и их спор происходит при:

дезинфекции
дератизации
*стерилизации
дезинсекции

Второй стадии пролежней соответствует клиническая картина

устойчивая гиперемия кожи, не проходящая после прекращения давления; кожные покровы не нарушены
разрушение кожных покровов вплоть до мышечного слоя с проникновением в мышцу, могут быть жидкие выделения из раны
поражение всех мягких тканей, наличие полости, в которой видны сухожилия и/или костные образования
*стойкая гиперемия кожи, отслойка эпидермиса, поверхностное нарушение целостности кожных покровов с распространением на подкожную клетчатку

Ритм пульса определяют по:

силе, с которой нужно прижать лучевую артерию, чтобы полностью прекратились ее пульсовые колебания
*интервалу между пульсовыми волнами
числу пульсовых волн за 1 минуту
наполнению артерии кровью

Уничтожение в окружающей среде патогенных микроорганизмов называется:

дератизацией
дезинсекцией
стерилизацией
*дезинфекцией

Первичная профилактика табакокурения направлена на:

людей, бросивших курить, для предупреждения рецидива
людей, которые недавно начали курить
*некурящих людей
курящих людей для оказания помощи в отказе от курения

Документ, который выдается пациенту при наличии у него показаний к санаторно-курортному лечению

контрольную карту диспансерного наблюдения (у.ф. 30)
*справку для получения путевки (у.ф. 070)
санаторно-курортную карту (у.ф. 072)
направление на медико-социальную экспертизу (у.ф. 88)

Анатомо-функциональные изменения пищеварительной системы у лиц пожилого возраста:

усиление перистальтики кишечника
уменьшение длины кишечника
*снижение перистальтики кишечника
гипертрофия обкладочных клеток желудка

Принципом дифференцирования контингента для диспансерного наблюдения по группам здоровья является:

выявление заболеваний на ранних стадиях и проведение лечебно-оздоровительных мероприятий
*выделение групп, однородных по состоянию здоровья и степени активности патологического процесса
накопление контингентов в легких группах за счет уменьшения их в тяжелых
выявление ранних стадий заболеваний по степени активности

Иммунопрофилактика заключается в:

проведении медицинских осмотров
улучшении условий труда и отдыха
повышении материального благосостояния
*проведении прививок

Острота зрения, слуха у лиц пожилого и старческого возраста:

повышается
не изменяется
*снижается
незначительно повышается

К исследованиям, проводимым пациенту при наличии факторов риска развития рака желудка, относится

анализ кала на скрытую кровь 1 раз в год
*эзофагогастродуоденоскопия 1 раз в 3 года
эндоскопическое исследование кишечника
контрастная рентгеноскопия желудка 1 раз в год

К достоверным признакам биологической смерти не относится:

появление трупных пятен
*расширение зрачков и утрата их реакции на свет
симптом «кошачьего глаза»
появление трупного окоченения

Шок при инфаркте миокарда:

травматический
гемотранфузионный
анафилактический
*кардиогенный

У взрослых к первому этапу СЛР относится:

контроль показателей кровообращения

*проведение закрытого массажа сердца
проведение искусственной вентиляции легких
обеспечение проходимости верхних дыхательных путей

Неоказание медицинской помощи без уважительной причины человеку, нуждающемуся в ней – это:

*преступление
взяточничество
должностной подлог
злоупотребление служебным положением

Порция "В" при дуоденальном зондировании – это:

содержимое 12 перстной кишки
*содержимое желчного пузыря
желчь из печёночных протоков
содержимое желудка

Частота компрессий грудной клетки при СЛР у взрослых составляет (в минуту):

40-50
20-30
130-150
*100-120

К инвазивным процедурам относится:

пассивное кормление пациента
подготовка пациента к исследованию
проведение мероприятий по личной гигиене тяжелобольных
*проведение в/м, в/в, п/к, инъекций

Гипотрофия – это расстройство питания:

с превышением массы тела
без нарушений массы тела
с нормальной массой тела
*с дефицитом массы тела

К развитию экспираторной одышки при приступе бронхиальной астмы приводит:

*спазм гладкой мускулатуры бронхов, отек слизистой оболочки бронхов и скопление вязкой мокроты
воспаление плевральных листков
отек гортани
повышение давления в малом круге кровообращения

Приоритетная проблема пациента при экссудативном плеврите:

слабость
головная боль
*нарастающая одышка
снижение аппетита

Пострадавший с подозрением на сотрясение головного мозга госпитализируется в отделение:

хирургическое
интенсивной терапии и реанимации
*травматологическое или нейрохирургическое
реанимационное

Медицинский работник – это физическое лицо, которое работает в медицинской организации и:

*медицинская деятельность является его должностной обязанностью
обучает студентов в колледже
занимается просветительской деятельностью
имеет фармацевтическое образование

Колоноскоп используется для осмотра слизистой оболочки:

тонкой кишки
мочевого пузыря
*толстой кишки

желудка

Рентгенологическое исследование почек и мочевыводящих путей с контрастированием называется:

томография

хромоцистоскопия

*экскреторная урография

ирригоскопия

Понятие «кумуляция» обозначает:

привыкание

зависимость

*накопление

повышенная чувствительность

Критерий эффективности диспансеризации при стенокардии

*переход из III-го во II-й функциональный класс

переход из II-го в III-й функциональный класс

назначение группы инвалидности

увеличение трудопотерь

Ожирению второй степени соответствует индекс массы тела:

18 кг/м²

*36 кг/м²

25 кг/м²

41 кг/м²

Немодифицируемым фактором, способствующим развитию рака молочной железы, является:

употребление табака и алкоголя

несбалансированное питание

*половозрастная принадлежность

недостаточная физическая активность

Деятельность школ здоровья является формой проведения:

социальной профилактики

первичной профилактики

*вторичной профилактики

популяционной профилактики

К методам предупреждения возникновения болезней сердца относится:

трехразовое обильное питание, гиподинамия

*режим питания, умеренная физическая нагрузка, контроль массы тела

ограничение физической нагрузки, прием биодобавок

занятия с анаэробной физической нагрузкой

В развитии артериальной гипертензии большое значение имеет:

*нарушение липидного обмена

длительное переохлаждение

очаг хронической инфекции

прием снотворных

У онкологического больного при резкой отмене наркотического средства развивается

эйфория

зависимость

толерантность

*абстиненция

Антисептикой называется:

уничтожение болезнетворных микробов

комплекс мероприятий, предупреждающих попадание микробов в рану

комплекс мероприятий по обеззараживанию помещений

*комплекс мероприятий, направленных на уничтожение микробов в ране, организме

Санитарно-противоэпидемическим режимом медицинской организации называется комплекс мероприятий, направленных на:

регулярный контроль выполнения требований асептики и антисептики
меры предосторожности при работе с пациентами в медицинских организациях
уничтожение болезнетворных микроорганизмов в окружающей среде
*предупреждение возникновения, распространения и ликвидации инфекционных заболеваний, связанных с оказанием медицинской помощи

Признак желудочного кровотечения:

изжога
*рвота в виде кофейной гущи
рвота пищей, съеденной накануне
отрыжка

Признак острой массивной кровопотери:

гиперемия кожных покровов
повышение артериального давления
*слабый частый пульс
повышение температуры тела

Регургитацией называется:

*затекание жидкого желудочного содержимого по пищеводу в полость ротоглотки
вид носового кровотечения
гиперсаливация
затекание содержимого ротоглотки в трахею

Контроль за количеством выпитой и выделенной жидкости проводится для определения функции:

*почек
печени
селезенки
желудочно-кишечного тракта

Первое место в структуре инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, занимают:

кишечные инфекции
*гнойно-септические инфекции
инфекции кожных покровов
инфекции мочевыводящих путей

Эффект действия нитроглицерина наступает через:

20-25 минут
*1-2 минуты
15-20 минут
10-15 минут

Дезинфекция, проводимая в очаге после удаления из него источника инфекции:

очаговая
профилактическая
текущая
*заключительная

К фактору риска развития атеросклероза относится высокий уровень:

липопротеидов высокой плотности
*липопротеидов низкой плотности
креатинина
билирубина

Наиболее частый симптом злокачественного новообразования простаты

боль в промежности, крестце
*дизурия
нарушение акта дефекации
микрогематурия

К объективным методам обследования относится:

беседа с родственниками

*измерение давления

представление пациента о своем здоровье

выявление проблем пациента

Цвет кожных покровов при гепатите А:

*желтушный

гиперемированный

бледный

цианотичный

Наиболее эффективная современная система делопроизводства в медицинских организациях предполагает использование:

пишущих машинок

ведение картотеки

*медицинских информационных систем (МИС)

прошнурованных журналов

Заболевание, не относящееся к группе кишечных инфекций:

*вирусный гепатит В

дизентерия

сальмонеллез

холера

Учащение пульса более 85 – 90 ударов в минуту, называется:

*тахикардией

брадикардией

асистолией

гипертонией

Ведущая причина геморрагического инсульта:

нерациональное питание

психо-эмоциональное перенапряжение

*атеросклероз сосудов головного мозга

избыточный вес

Увеличение ночного диуреза:

пиурия

дизурия

полиурия

*никтурия

Воспаление гортани:

фарингит

*ларингит

эзофагит

тонзиллит

Дефицит йода в рационе питания детей приводит к:

заболеваниям поджелудочной железы

*повышению риска заболеваний щитовидной железы

повышению риска заболеваний надпочечников

повышенной заболеваемости острыми респираторными заболеваниями

Необходимы активные мероприятия по снижению уровней всех факторов риска, если суммарный сердечно-сосудистый риск SCORE:

высокий или низкий

умеренный

низкий

*умеренный, высокий и очень высокий

Одномоментно Трамал может быть выписан сроком на

2 недели

1 месяц

*5 дней

10 дней

Соотношение количества выпитой и выделенной жидкости называется:

дневной диурез

анурез

*водный баланс

суточный диурез

Нестероидные противовоспалительные препараты могут вызвать:

анемию

*желудочно-кишечные кровотечения

снижение артериального давления

одышку

Свойство дезинфицирующего средства, обеспечивающее уничтожение бактерий:

фунгицидное

бактериостатическое

вирулицидное

*бактерицидное

Многоразовые медицинские изделия после инвазивных манипуляций подвергаются:

только стерилизации

*дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации

только дезинфекции

только предстерилизационной очистке

В помещениях медицинской организации влажную уборку с использованием дезсредств проводят не реже:

*2-х раз в сутки

4-х раз в сутки

3-х раз в сутки

одного раза в сутки

Характерный признак невралгии тройничного нерва:

рвота

ригидность затылочных мышц

отсутствие складок на лбу при поднимании бровей

*приступообразные боли на пораженной половине лица

Одышка -это:

*ощущение нехватки воздуха

удлинение выдоха

удлинение вдоха

укорочение вдоха

Показатель «ОХВАТ НАСЕЛЕНИЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЕЙ» отражает отношение:

*количества лиц, прошедших диспансеризацию, к общему числу лиц, подлежащих диспансеризации

числа зарегистрированных заболеваний к общему числу лиц с временной и стойкой нетрудоспособностью

числа зарегистрированных заболеваний к численности проживающего населения

численности населения, которому проведены необходимые исследования и осмотры врачей к числу

зарегистрированных случаев заболеваний

Интенсивная физическая активность:

соответствует 30 тысячам шагов в сутки вне помещения

соответствует состоянию покоя в положении сидя или лежа

*значительно повышает частоту сердечных сокращений и вызывает появление пота и сильной одышки

оставляет ощущение тепла и легкой одышки

Схема вакцинации «0 – 1 – 6» применяется для вакцинации против:

*вирусного гепатита В
кори, ветряной оспы, краснухи
дифтерии, коклюша, столбняка
гриппа

Наиболее эффективными направлениями в комплексе лечебного воздействия на табакозависимость являются:

дыхательная гимнастика, фитотерапия
*психотерапия, заместительная терапия
физиотерапия, фармакотерапия
гелиотерапия, аэротерапия

На первой ступени боли применяют препарат

трамадол
фентанил
стадол
*кетопрофен

Средство наглядного метода гигиенического воспитания:

дискуссия
лекция
*видеофильм
беседа

При желудочно-кишечном кровотечении пациента необходимо обеспечить:

внутримышечным введением викасола
внутривенным введением хлористого кальция
*пузырем со льдом на живот
введением анальгетиков

Должностные преступления – это:

*злоупотребление служебным положением, халатность, должностной подлог
клевета
оставление в опасности
оскорбление

К свойству дезинфицирующего средства, обеспечивающего уничтожение вирусов относится:

бактериостатическое
фунгицидное
бактерицидное
*вирулицидное

К облигатному предраку можно отнести

*пигментную ксеродерму
кератому
старческую атрофию кожи
рубцовую атрофию кожи

Социально-медицинская помощь на дому лежачим больным в первую очередь предусматривает

содействие в проведении медико-социальной экспертизы
организацию прохождения диспансеризации
*профилактику и лечение пролежней, выполнение мероприятий ухода
проведение санитарно-просветительской работы

Трудоспособностью называют

способность человека к выполнению работы определенной квалификации, объема и качества
совокупность возможностей человека, не зависящих от состояния его здоровья, позволяющих ему заниматься трудовой деятельностью
вид и объем трудовой деятельности человека
*совокупность физических и духовных возможностей человека (зависящих от состояния его здоровья), позволяющих ему заниматься трудовой деятельностью

Причина развития терминального состояния:

*кровопотеря более 60% объема циркулирующей крови
хроническое заболевание желудка
стадия реконвалесценции вирусного гепатита В
компенсированный сахарный диабет

Внутримышечные инъекции выполняют в квадрант ягодицы:

нижненааружный
*верхненааружный
верхневнутренний
нижневнутренний

Длительность действия морфина составляет:

*4-6 часов
1-2 часа
8-10 часов
10-12 часов

Группа лиц с наследственной предрасположенностью к злокачественным новообразованиям подлежит динамическому наблюдению

1 раз в два года
*1 раз в год
2 раза в год
1 раз в 6 месяцев

Основной симптом стенокардии:

*сжимающая, давящая боль
тошнота
слабость
одышка

Корешки использованных и испорченных бланков листов нетрудоспособности хранятся в течение

10 лет
1 года
*3 лет
5 лет

Предстерилизационная очистка использованных медицинских изделий многократного применения проводится с целью:

*удаления дезинфектантов, белковых, жировых, лекарственных и др. загрязнений
удаления лекарственных средств
дезинфекции
удаления белковых загрязнений

Пустые ампулы из-под наркотиков уничтожаются

старшей медсестрой по мере накопления
врачами отделения
*специальной комиссией
главным врачом

Тара, в которую собирается острый инструментарий (иглы, перья):

*одноразовый непрокальваемый контейнер с плотно прилегающей крышкой
одноразовый пакет желтого цвета
многократная емкость с плотно прилегающей крышкой
картонная коробка желтого цвета

К факторам биологической природы, воздействующим на медицинских работников в процессе их труда, относятся:

*вирусы и микроорганизмы
контроль за профессиональной деятельностью
рентгеновское, ультрафиолетовое, лазерное и ионизирующее излучение
пары химических веществ и лекарственных препаратов

Пациенты с полипами желудка подлежат диспансерным осмотрам с периодичностью

- 1 раз в год
- *2 раза в год
- 1 раз в 2 года
- 1 раз в 5 лет

При гипертоническом кризе пожилому человеку медицинская сестра даст под язык:

- клофелин
- *капотен
- анаприлин
- коринфар

Одним из критериев отбора пациентов для оказания паллиативной помощи является:

- ожидаемая продолжительность жизни не более 3-6 месяцев
- *нулевой реабилитационный потенциал
- ожидаемая продолжительность жизни не более года
- ожидаемый эффект от применения новейших способов лечения

При измерении артериального давления систолическим давлением называется:

- *показатель шкалы манометра при появлении первых звуков (тонов Короткова)
- разница систолического и пульсового давления
- сумма пульсового и систолического давления
- величина, соответствующая полному исчезновению звуков (тонов Короткова)

Углублённое профилактическое консультирование проводится гражданам с группой здоровья:

- *Ша и ШБ
- I и Ша
- I и ШБ
- I и II

При проведении предрейсового осмотра наличие алкоголя определяется с помощью

- метода Видмарка
- пробы Раппопорта
- количественного определения содержания алкоголя в крови
- *индикаторных тест - систем

Субфебрильной температурой тела называется (в °С):

- 39-39,5
- *37,1-38
- 38,1-38,2
- 38-38,5

Предикторами неблагоприятного ближайшего прогноза у больных с терминальной хронической недостаточностью являются

- отсутствие видимой причины ухудшения состояния
- *отсутствие положительной динамики после предшествующей госпитализации, несмотря на адекватную терапию
- отсутствие эффекта от коррекции доз диуретиков и вазодилататоров
- ухудшение функции почек

Возбуждение и беспокойное поведение больного, сопровождающееся стонами и гримасами, свидетельствует о наличии

- душевной боли
- постепенного угасания сознания
- *физической боли
- признаков депрессии

Ответственность за организацию безопасной рабочей среды в медицинской организации несет:

- пациент
- профсоюз
- работник
- *работодатель

К паратрофии относятся состояния с избытком:

массы тела и роста более 10%

*массы тела более 10%

массы тела от 5 до 9%

массы тела более 2%

Пациентка, прооперированная по поводу пролиферативной формы фиброзно-кистозной мастопатии, должна наблюдаться у врача

*онколога

маммолога

гинеколога

хирурга

Характеристика резаной раны:

края неровные, вокруг кровоизлияние

большая глубина, точечное входное отверстие

*края ровные, зияет

края неровные, зияет

Для восстановления речи у пациента с острым нарушением мозгового кровообращения необходимы занятия со специалистом:

*логопедом

врачом-неврологом

врачом-психиатром

психологом

Наиболее взаимосвязаны свойства пульса

*напряжение и наполнение

частота и ритм

скорость и частота

напряжение и ритм

По определению ВОЗ здоровье - это:

динамическая гармония личности с окружающей средой, достигнутая посредством адаптации, средство жизни

*состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней

состояние полного физического благополучия

отсутствии болезней

Длительное воздействие солнечных лучей – фактор риска возникновения:

болезней сердечно-сосудистой системы

болезней пищеварения

болезни выделительной системы

*злокачественных опухолей кожи

Утилизация медицинского мусора класса Б выполняется путем:

захоронения на территории больницы

складирования на хозяйственном дворе больницы

*сжигания в печах или захоронения на спец.полигонах

вывоза на городскую свалку бытового мусора

Для диагностики заболеваний щитовидной железы в крови определяют:

гемоглобин, цветовой показатель

инсулин, глюкагон

лейкоциты, СОЭ

*гормоны Т3, Т4, ТТГ

Курение оказывает влияние на частоту возникновения

рака легкого, желудка, толстой кишки

рака легкого, яичников, мочевого пузыря

*рака легкого, гортани, мочевого пузыря

рака легкого, почки, щитовидной железы

Меры, направленные на второе звено эпидемического процесса:

использование антибактериальных препаратов
изоляция больного
иммунизация
*дезинфекционные мероприятия

Основанием для предоставления лицу социальных услуг является условие

достижение лицом пенсионного возраста
наличие хронического заболевания
*частичная или полная утрата способности к самообслуживанию и/или самостоятельному передвижению
одинокое проживание в жилище

Разглашение врачебной тайны возможно в случае:

*опасности распространения некоторых инфекционных заболеваний
по просьбе руководителя
некоторых генетических дефектов у одного из супругов
по просьбе близких родственников

При инфаркте миокарда боль купируется:

диуретиками
бета-блокаторами
статинами
*наркотическими анальгетиками

Информированное добровольное согласие пациента на медицинское вмешательство можно получить с возраста

16 лет
18 лет
*15 лет
17 лет

Показания к использованию медицинских перчаток:

*асептические процедуры, контакты с кровью и другими биологическими жидкостями
беседа с пациентом
работа с паровыми стерилизаторами
работа с воздушными стерилизаторами

Повышать квалификацию медицинская сестра должна:

по потребности, ею определяемой
*в течение всей профессиональной жизни
по мере необходимости, определяемой руководством
при выявлении нарушений ею технологии

Пациентам с хроническим гастродуоденитом проводится гастродуоденоскопия с периодичностью

*по показаниям
1 раз в год
1 раз в 2 года
1 раз в полгода

Паллиативная медицинская помощь в ФЗ №323 определяется как

оказание медико-социальной помощи престарелым и инвалидам в целях улучшения качества жизни
комплекс мероприятий, направленных на оказание помощи престарелым людям в целях улучшения качества жизни
оказание терапевтической помощи инвалидам для облегчения тяжелых проявлений заболевания
*комплекс мероприятий, направленных на избавление от боли и облегчение других тяжелых проявлений заболевания, в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан

Дисбактериоз – это:

*нарушение количественного и качественного состава микрофлоры
инфекционное заболевание
полное отсутствие микрофлоры
внутрибольничная инфекция

Метастазом называют
обратное развитие опухоли
рост опухоли
возврат опухоли
*отсев опухоли

Анализ мочи по Нечипоренко проводится для определения в единице объема:
белка, глюкозы
ацетона, глюкозы
*лейкоцитов, эритроцитов
солей, билирубина

При приеме гериатрическими пациентами В-блокаторов, медсестра контролирует:
суточный диурез
массу тела
состояние полости рта
*артериальное давление, пульс

При хроническом гастрите из рациона исключают:
молочные продукты
отварные овощи
кашу
*жирную, жареную пищу

Данные о прохождении медосмотров подлежат внесению в документ
санаторная карта
паспорт здоровья
медицинская карта амбулаторного больного
*личная медицинская книжка

Наиболее рациональная модель взаимоотношений «ВРАЧ-ПАЦИЕНТ» с позиции интересов пациента
“договорная модель” - врач как “поставщик”, а пациент - “потребитель медицинских услуг”
“инженерно-техническая модель” - врач как специалист
“патерналистская модель” - врач как “духовный отец”
*“кооперативная модель” - сотрудничество врача и пациента

Пикфлоуметрией называется метод, позволяющий измерить:
объем форсированного выдоха за 1 секунду
содержание кислорода в выдыхаемом воздухе
*пиковую скорость выдоха
жизненную емкость легких

Количество периодов в развитии лихорадки:
*3
4
2
5

Появление у лихорадящего пациента резкой слабости, обильного холодного пота, бледности кожных покровов, нитевидного пульса и снижение АД наиболее вероятно при:
*критическом снижении температуры
субфебрилитете
быстром и значительном повышении температуры
литическом снижении высокой температуры

Факт наличия инвалидности у освидетельствуемых граждан устанавливается
врачом поликлиники
*бюро медико-социальной экспертизы
врачебной комиссией
центром социального обслуживания населения

Основным признаком первого периода лихорадки является:

- жажда
- *озноб
- рвота
- чувство жара

Время ожидания в очереди в бюро медико-социальной экспертизы не должно превышать (мин.)

- 45
- *15
- 60
- 30

Необратимым этапом умирания организма является

- агония
- клиническая смерть
- *биологическая смерть
- преагония

Поименные списки для проведения периодических осмотров составляются работодателем и направляются в медицинскую организацию до согласованной даты осмотра не позднее, чем за

- 4 месяца
- *2 месяца
- 2 недели
- 1 месяц

Наиболее логическая последовательность психологических реакций у инкурабельных онкологических больных

- шок, стадия депрессии, стадия агрессии, стадия отрицания, стадия примирения
- *шок, стадия отрицания, стадия агрессии, стадия депрессии, стадия примирения
- стадия возражения, шок, стадия агрессии, стадия депрессии, стадия примирения
- стадия возражения, стадия агрессии, стадия депрессии, стадия примирения, шок