

Базовые тестовые задания для подготовки к итоговой аттестации по программе профессиональной переподготовки по специальности «Сестринское дело»

Разъяснения: Правильные ответы помечены знаком *. В контрольные варианты тестов из представленного перечня будут выбраны вопросы в произвольном порядке. Расположение правильных ответов в разных вариантах контрольных тестов может меняться!

Физическое лицо, которому оказывается медицинская помощь:

больной человек

*пациент

старый человек

гражданин

Доступность и качество медицинской помощи в РФ обеспечиваются:

*наличием необходимого количества медицинских работников

муниципальным управлением здравоохранением

функционированием частной системы здравоохранения

государственным управлением здравоохранением

На сортировочном посту личный состав работает с использованием средств индивидуальной защиты:

защитная одежда и приборы дозиметрического контроля

защитная одежда, перчатки, очки

защитная одежда, перчатки, щитки

*респираторы, резиновые перчатки, защитная одежда и приборы дозиметрического контроля

Патологическое урежение дыхания:

*брадипноэ

тахипноэ

апноэ

диспноэ

Люди, погибшие или пропавшие без вести при возникновении ЧС – это:

ситуационно-обусловленные потери

общие потери

санитарные потери

*безвозвратные потери

Совокупность норм поведения медицинского работника и их регулирование в процессе оказания медицинской помощи – это:

сестринские технологии

сестринское дело

деонтология

*медицинская этика

Среди причин смерти при катастрофах на первом месте находится:

*травма не совместимая с жизнью

травматический шок

острая кровопотеря

психотравма

Оптимальным сроком оказания первой помощи пострадавшим принято считать с момента поражения:

3 часа

6 часов

1 час

*20-30 минут

К основным сортировочным признакам относится:

тяжесть состояния пострадавшего

*опасность пострадавшего для окружающих, нуждаемость в лечебных мероприятиях и в эвакуации

вид повреждения

развитие шока и комы

К видам паллиативной помощи относится:

диспансеризация
скорая помощь
*консультативная помощь
радикальная операция

Санаторно-курортное лечение включает медицинские профилактические, лечебные и реабилитационные мероприятия на основе:

*природных лечебных ресурсов
лекарственной терапии
гомеопатии
иглоукалывания

Вакцинацией БЦЖ формируется иммунитет:

естественный
*активный специфический
неспецифический
пассивный специфический

Первая помощь, до оказания медицинской помощи, оказывается гражданам при угрожающих их жизни и здоровью:

развлекательных мероприятиях
террористических актах
*несчастных случаях, травмах, отравлениях, состояниях и заболеваниях
травмах

При лечении диареи рекомендуется отвар из:

толокнянки
цветов бессмертника
мяты
*ольховых соплодий

Трансплантация органов и тканей человека от живого донора или трупа применяется:

по решению главного врача
по желанию пациента
по решению лечащего врача
*в случае, если другие методы лечения не могут обеспечить сохранение жизни

При приступе бронхиальной астмы выделяется:

*небольшое количество вязкой стекловидной мокроты
мокрота в виде «малинового желе»
«ржавая» мокрота
большое количество гнойной мокроты

При составлении пищевого рациона пациенту с гипертонической болезнью рекомендуют:

*ограничить употребление соли и жидкости
ограничить употребление рафинированных углеводов
усилить питание
ограничить употребление животных жиров

К группе лекарственных препаратов, обладающих гепатопротекторным действием относится:

дротаверин (но-шпа)
панкреатин (фестал)
мебеверин (дюспаталин)
*эссенциале

Для смены постельного белья продольным способом пациенту, находящемуся на строгом постельном режиме, придают положение:

*на боку
«Симса»
на животе

на спине

Неоказание помощи больному без уважительных причин лицом, обязанным ее оказывать в соответствии с законом, если оно повлекло смерть или причинение тяжкого вреда здоровью больного, влечет за собой:

выговор

увольнение

*лишение права заниматься профессиональной деятельностью и свободы

замечание

При подозрении на лейкоз необходима консультация врача:

онколога

кардиолога

*гематолога

терапевта

Состояние новорожденного оценивается по шкале:

Цельсия

Петрусса

Ватерлоу

*Апгар

При подозрении на меланому необходима:

*консультация врача-онколога

диатермокоагуляция

обработка кожи 10% настойкой йода

криодеструкция

При подготовке пациента к ректороманоскопии или колоноскопии медицинская сестра должна выполнить назначение:

*очистительную клизму накануне и за 2 часа до исследования

масляная клизма утром

сифонная клизма вечером

сифонная клизма за 2 часа до исследования

Правовое регулирование проявляется в государственном воздействии на тот или иной процесс с использованием:

норм морали

религиозных норм

социальных норм

*норм права

Неэффективные реанимационные мероприятия продолжаются:

2 часа

15-20 минут

*30 минут

3-6 минут

Внутрикожно вводится:

кордиамин

ампициллин

*туберкулин

клофеллин

Промывание кишечника при сифонной клизме проводится:

5 раз

*до чистых промывных вод

3 раза

1 раз

При транспортировке пациента в кресле-каталке представляет опасность расположение рук:

на подлокотниках

*за пределами подлокотников

на животе

в скрещенном состоянии на груди

К основным симптомам гипогликемического состояния относятся:

одышка, сухой кашель
боли в области сердца, одышка
отеки, головная боль
*чувство голода, потливость

Индивидуальную одежду медицинского персонала, хирургических, акушерских, реанимационных отделений следует менять при загрязнении и не реже, чем:

*1 раз в день
1 раз в 2 дня
1 раз в неделю
2 раза в неделю

Для уменьшения побочных явлений во время лечения глюкокортикоидами требуется диета, богатая:

йодом
углеводами
*калием
железом

Изотонический раствор хлорида натрия имеет концентрацию:

1%
0,1%
10%
*0,9%

Профилактическое назначение антибиотиков показано при:

бронхите
*ревматизме
холецистите
гепатите

Потенциальной проблемой пациента при циррозе печени является:

снижение аппетита
желтуха
кожный зуд
*пищеводное кровотечение

При уходе за пациентом с гипсовой повязкой необходимо:

содержать пациента в тепле
следить за активностью пациента
*следить за кровоснабжением поврежденной конечности
следить за соблюдением диеты

Бледность кожных покровов наблюдается при:

острой печеночной недостаточности
отравлении угарным газом
*острой массивной кровопотере
острой почечной недостаточности

Мероприятия при обзорном осмотре пострадавшего для выявления и временной остановки наружного кровотечения включают:

только максимальное сгибание конечности в суставе
иммобилизацию конечности
наложение асептической повязки
*пальцевое прижатие артерии, наложение жгута, давящей повязки

Критерием эффективности закрытого массажа сердца является:

восстановление сознания
повышение температуры тела
*порозовение кожных покровов

повышение АД

Прием Геймлиха при инородном теле в гортани представляет собой:

сочетание искусственной вентиляции легких с непрямом массажем сердца

введение воздуховода

*серию из 5 толчков кулаком на область верхней половины живота с целью удаления инородного тела из верхних дыхательных путей

запрокидывание головы и открывание рта

Оптимальный срок оказания доврачебной помощи пострадавшему с момента поражения:

*1-2 часа

3 часа

не более 6 часов

4 -5 часов

Первая помощь при отморожении I степени:

*переодеть в сухую одежду

наложить повязку с фурациллином

обезболить

успокоить пострадавшего

Мешок «АМБУ» используется для:

сбора отходов класса Б

*проведения искусственной вентиляции легких

проведения непрямого массажа сердца

сбора отходов класса А

Одна из самых эффективных техник межличностного общения с пациентами, коллегами, студентами, родственниками – это техника:

*активного слушания

контраргументации

аргументации

ориентировки в собеседнике

Подготовка пациента к рентгенологическому исследованию пояснично-крестцового отдела позвоночника включает:

введение газоотводной трубки

*постановку очистительной клизмы и ограничение пищевого режима

проведения промывания желудка

рекомендации пациенту по отказу от курения перед исследованием

К физическому методу дезинфекции относится:

проветривание

вытряхивание

*кипячение

протираание

Одноразовые пакеты и емкости для сбора отходов класса Б имеют цвет:

*желтый

черный

красный

белый

Психологическая проблема пациента в предоперационном периоде:

учащенное мочеиспускание

рвота

*страх перед операцией

боль

Наличие на рабочем месте инструкции по охране труда и технике безопасности, инструкции по эксплуатации медицинского оборудования:

не обязательно

желательно
*обязательно
возможно

При старении изменения системы мочевого выделения характеризуются:

повышением тонуса мочеточников
увеличением вместимости мочевого пузыря
*снижением почечного кровотока
более редким мочеиспусканием

Договор о материальной ответственности за получение, хранение, использование медицинского инструментария и предметов ухода заключается:

*со старшей медицинской сестрой
с заведующим отделением
с главной медицинской сестрой, старшей медицинской сестрой
со старшей медицинской сестрой, с заведующим отделением

Обязательная иммунопрофилактика от бешенства проводится:

всему населению начиная с 16-летнего возраста
*ветеринарам
геологам
всему населения начиная с 10-летнего возраста

Ребенок делает первые шаги, говорит около 10 слов, начинает понимать запрет, приучается к навыкам опрятности в возрасте:

1 год 6 месяцев
9 месяцев
*12 месяцев
1 год 9 месяцев

Основной мерой профилактики заболеваний органов дыхательной системы у взрослого населения является:

*борьба с табакокурением
соблюдение принципов рационального питания
адекватная физическая нагрузка
борьба со стрессом

Вторичная профилактика онкологических заболеваний включает:

соблюдение диеты
регулярная физическая активность
*выявление и устранение предраковых заболеваний
нормализация массы тела

Вирусный гепатит В передается путем:

алиментарным
воздушно-пылевым
воздушно-капельным
*парентеральным

Модифицируемым (корректируемым) фактором риска развития заболеваний дыхательной системы чаще всего является:

гиподинамия
повышенные физические нагрузки
проживание в местности с хвойным лесом
*активное и пассивное курение

К факторам риска развития артериальной гипертензии относится:

низкое атмосферное давление
*стресс и психическое напряжение
прием снотворных
длительное переохлаждение

Первичная профилактика гипертонической болезни включает:

*формирование здорового образа жизни
предотвращение осложнений заболевания
предотвращение рецидивов заболевания
назначение белковой диеты

Обязательное медицинское страхование гарантирует:

*получение всеми гражданами РФ медицинской помощи определенного объема и уровня
выплату пособия в случае временной утраты трудоспособности
бесплатное получение гражданами высокотехнологичной дорогостоящей медицинской помощи
получение медицинской помощи минимального объема

Динамометрия оценивает:

количество шагов, сделанных в течение дня
продолжительность физической нагрузки
объем выдоха
*силу мышц

Уменьшение смертности и инвалидизации от онкологических заболеваний является целью:

третичной профилактики
социальной профилактики
*вторичной профилактики
первичной профилактики

Основной фактор роста аборт и родов среди подростков:

экологическая ситуация
*неосведомленность о методах и средствах контрацепции
избыточное использование контрацептивов
широкая доступность информации о половом воспитании

Немодифицируемым фактором риска развития заболеваний дыхательной системы является:

респираторные заболевания
табакокурение
*наследственность
гиподинамия

При положительном результате анализа кала на скрытую кровь пациента направляют к врачу:

неврологу
оториноларингологу
*проктологу
офтальмологу

Санитарное просвещение в стационаре является профилактикой:

социальной
*вторичной
популяционной
первичной

При попадании крови на кожу следует обработать её:

1-2% р-ром протаргола
*70% спиртом
3% перекисью водорода
1% р-ром бриллиантового зеленого

Первая помощь пациенту при инфаркте миокарда:

проводить в поликлинику на прием к участковому врачу
успокоить и уложить на правый бок, вызвать врача
*вызвать врача, уложить с приподнятым головным концом, обеспечить полный физический и психологический покой
вызвать врача, уложить с приподнятым ножным концом

Массовое заболевание, распространяющееся на несколько стран и континентов – это:

эндемия

спорадические заболевания
эпидемия
*пандемия

Информация о проведении профилактического медицинского осмотра несовершеннолетних и его результаты вносятся в:

маршрутную карту
учетную форму № 25/у-04
карту учета диспансеризации
*паспорт здоровья

При открытой ране грудной клетки необходимо:

наложить шину с возвращением костей в исходное положение
наложить шину
перевязать рану
*наложить окклюзионную повязку

Гигиеническое воспитание – это:

просветительная деятельность
воспитательная деятельность
обучающая деятельность
*комплексная просветительная, обучающая и воспитательная деятельность

Раннее прикладывание новорожденного к груди способствует:

профилактике мастита
быстрому росту ребенка
*усилению лактации
профилактике рахита

Первая вакцинация против полиомиелита проводится:

в 12 месяцев
*в 3 месяца
в первые 12 ч после рождения
на 3-7 сутки после рождения

Прививки против гриппа проводят:

*при угрозе эпидемии гриппа
большим гриппом
выезжающим за границу страны
переболевшим гриппом

Механическая антисептика – это:

наложение давящей повязки
*удаление из раны нежизнеспособных тканей
промывание раны раствором водорода пероксида
дренирование раны марлевым тампоном

При ожирении двигательную активность рекомендуют:

исключить
*увеличить
уменьшить
не изменять

Оптимальным для рождения ребенка считается возраст женщины:

25-35
*20-25
30-40
25-45

Особенность солевого состава воды при длительном ее употреблении является фактором риска для развития:

анорексии
диабета

*мочекаменной болезни
анемии

Основным количественным критерием, характеризующим уровень здоровья нации, является:

трудовой потенциал населения
уровень детской смертности
средняя продолжительность жизни
*ожидаемая продолжительность жизни населения

Вакцинация против полиомиелита проводится трёхкратно с интервалом:

30 дней
15 дней
*45 дней
60 дней

Профилактикой заболеваний репродуктивной системы является:

низкокалорийное питание
лечение соматических заболеваний
*предупреждение абортов
высококалорийное питание

Дезинфекция, проводимая в очаге в присутствии источника инфекции, называется:

профилактическая
физическая
заключительная
*текущая

Краткое профилактическое консультирование проводится гражданам с группой здоровья:

*I и II
с любой группой здоровья
I и IIIa
I и IIIб

Забота о собственном здоровье является:

добровольным выбором гражданина
ответственностью человека перед обществом
личным делом каждого гражданина
*обязанностью граждан

Алая кровь выделяется пульсирующей струей при кровотечении:

капиллярном
венозном
*артериальном
паренхиматозном

Прием преднизолона может вызвать развитие:

гиперкалиемии
*стероидной язвы
дистрофии
гипотензии

Признаки нагноения послеоперационной раны:

побледнение краев
*гиперемия, отек, усиление боли
промокание повязки кровью
выходение кишечных петель под кожу

Средство для наркоза:

кофеин
эфедрин
*ксенон
парацетамол

Тримеперидин (промедол) – это:

*наркотический анальгетик
аналептик
психостимулятор
ненаркотический анальгетик

Независимое сестринское вмешательство при легкой форме сальмонеллеза:

внутримышечное введение ампициллина
*уход при рвоте
парентеральное введение солевых растворов
проведение витаминотерапии

К важнейшим принципам охраны здоровья, согласно ФЗ РФ от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» относится:

медицинское страхование граждан
*соблюдение врачебной тайны
государственное управление здравоохранением
муниципальное управление здравоохранением

Проведение биологической антисептики предусматривает применение:

*средств биологического происхождения
дренирования ран
обработки ран с 3% раствором перекиси водорода
первичной хирургической обработки ран

Противопедикулезные мероприятия в медицинской организации проводят:

*медицинский персонал
пациенты
родственники пациента
врач приемного отделения

При атеросклерозе ограничивают продукты питания, содержащие:

витамин С
*жиры животного происхождения
калий
железо

Для совмещения в один этап дезинфекции и ПСО можно использовать дезсредства, обладающие:

дезинфицирующим и стерилизующим действием
только дезинфицирующим действием
*дезинфицирующим и моющим действием
дезинфицирующим и дезодорирующим действием

Оптимальное значение Ph мыла для мытья рук медперсонала:

10,0
*5,5
3,0
8,5

Спецодежду медперсонала в реанимационных отделениях следует менять:

2 раза в неделю и при загрязнении
1 раз в 2 дня и при загрязнении
1 раз в неделю и при загрязнении
*ежедневно и при загрязнении

Для обработки волосистой части головы при обнаружении педикулёза используется:

раствор глюкозы
раствор фурацилина
*лосьон «Ниттифор»
порошок гидрокарбоната натрия

«Экстренное извещение» об инфекционном заболевании отправляется в:

дезинфекционную станцию
управление здравоохранения
*территориальный орган Роспотребнадзора
районную бактериологическую лабораторию

Медицинский документ, в котором хранится информация, связанная с профессиональной деятельностью и ее влиянием на здоровье:

медицинская карта стационарного больного
карта диспансерного наблюдения
обменная карта родильного дома, родильного отделения больницы
*паспорт здоровья

Основной принцип философии сестринского дела - это уважение к:

политике государства
*жизни, достоинствам и правам человека
различным организациям
правительству

Пульсовое давление в норме составляет (мм рт.ст.):

20-40
*40-50
10-20
60-70

Для промывания желудка при пищевом отравлении применяется зонд:

*толстый
дуоденальный
тонкий
эндоскопический

Специфическими патологиями поражения населения в экстремальных условиях мирного времени являются:

сочетанные травмы
переломы
инфекционные заболевания
*психоневрологические стрессы, шок, ступор

Комплекс медицинских мероприятий, выполняемых средним медицинским персоналом, направленных на поддержание жизненно важных функций организма, предупреждение осложнений и подготовку пораженного к эвакуации - это:

первая врачебная помощь
первая помощь
*доврачебная помощь
квалифицированная медицинская помощь

Симптом вывиха:

патологическая подвижность в поврежденном суставе
крепитация костных отломков
*изменение относительной длины конечности
изменение абсолютной длины конечности

Шок, возникающий при острой массивной кровопотере:

*гиповолемический
гемотранфузионный
септический
кардиогенный

Альтернативный способ остановки артериального кровотечения:

давящая повязка
компресс
холод к ране
*закрутка

Индивидуальный противохимический пакет используется для проведения частичной:

дегазации и дезинфекции

*санитарной обработки и дегазации

дезинфекции

дезактивации

Показание к прекращению СЛР:

отсутствие признаков эффективного кровообращения

широкие зрачки

*появление признаков биологической смерти

отсутствие самостоятельного дыхания

Карманный ингалятор применяют пациенты с:

ринитом

гайморитом

*бронхиальной астмой

отитом

Гипербарическая оксигенация осуществляется:

через кислородную маску

*в барокамере

через носовой катетер

в кислородной палатке

Противопоказанием к применению нитроглицерина является артериальное давление ниже:

*100/60 мм рт.ст.

70/50 мм рт.ст.

90/70 мм рт.ст.

80/60 мм рт.ст.

Компетенции медицинской сестры при болевом синдроме у послеоперационного пациента:

измерение температуры

введение обезболивающего препарата

*создание удобного положения пациента в постели, вызов врача

применение ванночки с раствором перманганата калия

Для оформления и получения листка временной нетрудоспособности пациенту необходимо предоставить:

*паспорт

СНИЛС

медицинскую карту амбулаторного больного

полис ОМС

Тонومتر Маклакова используют для измерения давления:

венозного

артериального

капиллярного

*внутриглазного

Медицинское освидетельствование на наличие или отсутствие ВИЧ-инфекции является обязательным для:

сотрудников организаций, осуществляющих образовательную деятельность

*доноров крови, биологических жидкостей, органов и тканей

всего медицинского персонала

специалистов любой профессии перед трудоустройством

Суточный диурез у взрослых составляет:

*от 800 мл до 2000 мл

от 2000 мл до 3000 мл

от 200 мл до 500 мл

от 500 мл до 800 мл

Количество дыхательных движений меньше 16 в минуту называется:

*брадикардия
ортостаз
тахикардия
апноэ

Характер стула при желудочно-кишечном кровотечении:

кровянистый
*дегтеобразный
обесцвеченный
«овечий кал»

Метеоризм – это:

задержка стула более чем на 48 часов
спастические боли в кишечнике
частый жидкий стул
*патологическое газообразование в кишечнике

Философия сестринского дела – это система взглядов на взаимоотношения между:

врачом и медицинской сестрой
обществом и окружающей средой
*сестрой, пациентом, обществом и окружающей средой
сестрой и пациентом

Интервал между сбором мочи и доставкой в лабораторию должен быть не более:

8 часов
4 часов
*2 часов
1 часа

В паллиативной медицинской помощи центральным элементом системы поддержки пациента и его семьи является:

духовный аспект
социальный аспект
реабилитационный аспект
*медицинский аспект

Наиболее эффективным средством контрацепции, защищающим от заболеваний, передающихся половым путем, является:

*презерватив
гормональные препараты
внутриматочная спираль
диафрагма

При беременности наиболее вероятно развитие анемии:

серповидно-клеточной
гемолитической
гипопластической
*железодефицитной

Отсутствие дыхания – это:

брадикардия
диспноэ
*апноэ
тахикардия

У пациента с травматическим шоком III степени отмечается:

головная боль
*резкое снижение артериального давления
возбуждение
торможение

Внедрять новые технологии инвазивных вмешательств можно:

*если они утверждены руководством медицинской организации
если уверены в их эффективности
при ознакомлении с ними
по распоряжению старшей медицинской сестры

Обязательное медицинское страхование является:

системой, направленной на защиту прав медицинских работников
*составной частью государственной системы социального страхования
страхованием от несчастных случаев
системой, направленной на повышение размеров оплаты труда

В кабинете доврачебной помощи проводится прием пациентов:

*не нуждающихся во врачебном приеме
с легкими формами заболевания
имеющих талоны к врачу на день обращения
по самозаписи

Болевая, тактильная и температурная чувствительность у лиц пожилого и старческого возраста:

повышается
отсутствует
*снижается
не изменяется

Пораженные с тяжелыми и средней тяжести повреждениями, не представляющими непосредственной угрозы для жизни:

нуждаются в облегчении страданий
нуждаются в медицинской помощи по неотложным показаниям
не нуждаются в неотложной помощи
*нуждаются в медицинской помощи, но она может быть отсрочена

Характерный симптом при атеросклерозе артерий нижних конечностей:

*перемежающаяся хромота
отеки
одышка
слабость

Основные вложения в комплект индивидуальный медицинский гражданской защиты для оказания первой помощи:

*воздуховод ротовой, жгут кровоостанавливающий, перевязочные средства, антисептические, противоожоговые и обезболивающие препараты
доксидиклин амоксициллин + клавулановая кислота
карбоксим (антидот ФОС), шприц, салфетка антисептическая
калия йодид, калий-железо гексацианоферрат, ондансетрон

Комплекс простейших мероприятий, выполняемых на месте поражения в порядке само- и взаимопомощи, а также личным составом спасательных формирований, санитарных постов и санитарных дружин с использованием табельных и подручных средств – это:

первая врачебная помощь
доврачебная помощь
квалифицированная медицинская помощь
*первая помощь

При укусе человека животным может возникнуть опасность в:

переломе костей
развитии вирусной инфекции
*заражении бешенством
заражении туберкулезом

Возможное осложнение при проведении компрессий грудной клетки:

повреждение трахеи
*перелом ребер
перелом ключицы

перелом позвоночника

При мониторинге состояния пациента с отёками показано:

измерение температуры тела
измерение артериального давления
*определение суточного диуреза
подсчет частоты дыхания

При положительной азопирамовой пробе (наличие крови) появляется окрашивание:

сине-зеленое
*фиолетовое, переходящее в сиреневое
бурое
розовое

Управление сестринской деятельностью в медицинской организации осуществляет:

*главная медицинская сестра
старшая медицинская сестра
главный врач
заместитель главного врача по лечебному делу

Пациенту с сахарным диабетом рекомендуется:

ограничить употребление солей
*ограничить употребление рафинированных углеводов
ограничить употребление жидкости
усилить питание

При перемещении пациента в постели медицинской сестре следует:

наклониться вперед
слегка присесть
слегка наклониться назад
*убрать подушку и одеяло

Запись о проведении кварцевания процедурного кабинета делается:

перед началом рабочей смены
1 раз в неделю
в конце рабочей смены
*после каждого кварцевания

Газоотводная трубка взрослому пациенту вводится на глубину:

*20 – 30 см на 1 час
7 – 8 см на 2 часа
25 – 30 см на всю ночь
10 – 15 см на 1 час

Средства гормональной контрацепции у женщин обладают действием:

*подавления овуляции
снижения двигательной активности сперматозоидов
уничтожения сперматозоидов
сгущения цервикальной слизи

Сроки вакцинации против туберкулеза у доношенного ребенка:

8-9 день жизни
*3-7 день жизни
4-6 день жизни
7-8 день жизни

Право граждан РФ на охрану здоровья гарантируется:

Программой развития здравоохранения
Гражданским кодексом РФ
*Конституцией РФ и ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»
Трудовым Кодексом РФ

Неоказание помощи больному без уважительных причин лицом, обязанным ее оказывать в соответствии с законом, если оно повлекло смерть или причинение тяжкого вреда здоровью больного, влечёт за собой:

*лишение права заниматься профессиональной деятельностью и свободы

увольнение

замечание

выговор

Репродуктивный период в жизни женщины – это период:

полового созревания

угасания детородной функции

полового покоя

*наиболее благоприятный для зачатия, вынашивания и рождения ребенка

При подозрении на базалиому кожи необходима:

асептическая повязка

диатермокоагуляция

*консультация врача-онколога

смазывание ляписным карандашом

Задержкой стула считается его отсутствие в течение:

72 часов

36 часов

24 часов

*48 часов

За 20-30 минут до постановки лекарственной клизмы пациенту ставится:

сифонная клизма

газоотводная трубка

*очистительная клизма

гипертоническая клизма

Профессиональный медицинский уход осуществляет (-ют):

социальная служба

пациент и его родственники

друзья и знакомые

*медицинская сестра

При постановке очистительной клизмы наконечник в прямую кишку вводят на глубину (см):

2-4

20

40

*10-12

Топографически в желудке выделяют:

верхнюю часть

*кардиальный отдел

основание

нисходящую часть

Задача третичной профилактики:

предупреждение неблагоприятного влияния условий и образа жизни на здоровье

*максимальное восстановление качества жизни пациента

сохранение и развитие условий, способствующих улучшению здоровья

предупреждение прогрессирования заболевания

Предупреждение рецидивов онкологических заболеваний при диспансерном наблюдении является целью:

организации специализированной медицинской помощи

первичной профилактики

социальной профилактики

*вторичной профилактики

Врач, консультирующий пациентов с поражением артерий нижних конечностей:

невропатолог
терапевт
офтальмолог
*ангиохирург

Причина кандидозного стоматита:

кишечная палочка
аллергическая реакция
стафилококк
*дрожжеподобные грибы

В ежедневном рационе содержание овощей и фруктов должно составлять:

до 400 гр
*не менее 400 гр
до 100 гр
300 гр

Цель профилактического осмотра и обследования школьников врачами –специалистами, врачом-гинекологом, врачом-урологом:

*раннее выявление и профилактика развития заболеваний, которые приводят к нарушениям репродуктивной сферы
разработка программ оздоровления, лечения и реабилитации с учетом выявленных заболеваний
динамическое диспансерное наблюдение за детьми группы риска
раннее выявление групп риска по развитию

Диагностические критерии фактора риска «гиперхолестеринемия»:

повышенный уровень сахара в моче
повышенный уровень артериального давления
уровень глюкозы плазмы натощак 6,1 ммоль/л и более
*уровень общего холестерина 5 ммоль/л и более

Иммунитет после перенесенной кори:

*напряженный стойкий
кратковременный, в течении 2 лет
кратковременный, в течении 1 года
не вырабатывается

Целевая аудитория при проведении третичной профилактики заболеваний:

*пациенты с хроническими формами заболеваний
выздоровливающие после перенесенных острых заболеваний
пациенты с факторами риска заболеваний
люди из групп риска

Продолжительность ежедневной физической нагрузки для профилактики гиподинамии – не менее:

15 минут
*30 минут
60 минут
20 минут

Физическая активность способствует:

перестройке жирового обмена в сторону увеличения содержания в организме жировой ткани
уменьшению потребности в пище
снижению приспособительных и компенсаторных реакций
*поддержанию обмена веществ на оптимальном уровне

Пациент – это:

*физическое лицо, которому оказывается медицинская помощь
человек, нуждающийся в социальной защите
родственник больного человека
посетитель медицинской организации

Самым здоровым сном является сон в период:

*22.00 – 06.00

01.00 – 03.00

00.00 – 04.00

03.00 – 06.00

Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи (ИСМП), развиваются только при наличии:

источника инфекции

*источника инфекции, факторов передачи, восприимчивого человека

источника инфекции, механизмов и факторов передачи

источника инфекции и восприимчивого человека

Медицинский персонал одноразовые медицинские перчатки:

*меняет после каждой манипуляции

не меняет, однократно протирая спиртом

меняет в конце рабочего дня

не меняет, двукратно протирая спиртом

При гриппе пациенту рекомендуют:

принимать антибиотики

снижать температуру ниже 38°C

*обильное витаминизированное питье

обеззараживать испражнения

Тело умершего пациента транспортируют в:

терапевтическое отделение

*патологоанатомическое отделение

реанимационное отделение

приемное отделение

Аутоинвазия характерна для:

для всех гельминтозов

трихоцефалеза

аскаридоза

*энтеробиоза

Полное уничтожение микроорганизмов и их спор происходит при:

дезинфекции

дератизации

*стерилизации

дезинсекции

Персонал, не иммунизированный против гепатита В, к работам по обращению с медицинскими отходами классов

Б и В:

допускается при наличии противопоказаний к вакцинации

*не допускается

допускается при наличии медицинского отвода к вакцинации

допускается во всех случаях

Режим стерилизации инструментария многократного использования в паровом стерилизаторе:

*132°C, 2 атм, 20 минут

180°C, 3 атм, 20 минут

120°C, 4 атм, 20 минут

120°C, 1,1 атм, 20 минут

Подготовка пациента к операции включает:

чистку зубов

*опорожнение мочевого пузыря

прием стакана жидкости

прием пищи

Смена постельного белья пациентам в отделениях реанимации и интенсивной терапии проводится:

1 раз в 2 дня
1 раз в 7 дней
1 раз в 3 дня
*ежедневно

Барьеры в общении между людьми, снижающие его эффективность:

искреннее сочувствие

активное слушание

*критика и советы, оценка другого человека, указания и приказной тон, переключение темы на себя
положительная обратная связь

Важным этапом предупреждения профессионального заражения гемоконтактными и иными инфекциями является:

ежегодное обследование

обследование всех пациентов

*оценка факторов риска в своей работе

уклонение от работы с инфицированными пациентами

Контролируя параметры искусственной вентиляции легких, медсестра регулирует:

центральное венозное давление

частоту сердечных сокращений

* частоту дыхательных движений

артериальное давление

Структурно-функциональной единицей почки является:

долька

ацинус

фолликул

*нефрон

При подозрении на сибирскую язву персонал надевает:

второй халат

маски

*противочумные костюмы

халаты, застегивающиеся сзади

При бронхиальной астме применяют:

бисопролол

*сальбутамол

метопролол

пропранолол (анаприлин)

Воспаление пупочной ранки новорожденного называется:

дерматит

потница

*омфалит

гемангиома

Основной путь заражения медперсонала туберкулезом:

проглатывание

инокуляция

имплантация

*вдыхание

Фактором риска развития ишемической болезни сердца является:

*гиподинамия

гипотония

переохлаждение

гиповитаминоз

Ритм пульса определяют по:

силе, с которой нужно прижать лучевую артерию, чтобы полностью прекратились ее пульсовые колебания

*интервалу между пульсовыми волнами
числу пульсовых волн за 1 минуту
наполнению артерии кровью

Уничтожение в окружающей среде патогенных микроорганизмов называется:

дератизацией
дезинсекцией
стерилизацией
*дезинфекцией

Первичная профилактика табакокурения направлена на:

людей, бросивших курить, для предупреждения рецидива
людей, которые недавно начали курить
*некурящих людей
курящих людей для оказания помощи в отказе от курения

Анатомо-функциональные изменения пищеварительной системы у лиц пожилого возраста:

усиление перистальтики кишечника
уменьшение длины кишечника
*снижение перистальтики кишечника
гипертрофия обкладочных клеток желудка

Лаборатория для исследования кала на яйца гельминтов и простейших:

иммунологическая
радиоизотопной диагностики
бактериологическая
*клиническая

Работа по гигиеническому воспитанию в стационаре направлена на:

*пациентов, находящихся в стационаре
все население, проживающее на территории обслуживания стационара
взрослое население, проживающее на территории обслуживания стационара
работающую часть населения, проживающую на территории обслуживания стационара

Единицей учета вакцинных препаратов является:

*доза
ампула
миллилитр
упаковка

При составлении пищевого рациона больному язвенной болезнью желудка рекомендуется:

*механически и химически щадящее питание
разгрузочные дни
повышенное количество белка
ограничение животных жиров

Принципом дифференцирования контингента для диспансерного наблюдения по группам здоровья является:

выявление заболеваний на ранних стадиях и проведение лечебно-оздоровительных мероприятий
*выделение групп, однородных по состоянию здоровья и степени активности патологического процесса
накопление контингентов в легких группах за счет уменьшения их в тяжелых
выявление ранних стадий заболеваний по степени активности

Иммунопрофилактика заключается в:

проведении медицинских осмотров
улучшении условий труда и отдыха
повышении материального благосостояния
*проведении прививок

Острота зрения, слуха у лиц пожилого и старческого возраста:

повышается
не изменяется
*снижается

незначительно повышается

Ребенок 4-х месяцев должен уметь:

*в положении на животе поднимать голову и верхнюю часть туловища
ползать
самостоятельно садиться
переворачиваться с живота на спину

В качестве источника энергии организм использует в первую очередь:

белки
минеральные вещества
витамины
*углеводы

Резерв энергии в организме:

витамины
белки
углеводы
*жиры

Наиболее часто гепарин вводят в подкожную клетчатку:

ягодиц
*живота
плеча
предплечья

К достоверным признакам биологической смерти не относится:

появление трупных пятен
*расширение зрачков и утрата их реакции на свет
симптом «кошачьего глаза»
появление трупного окоченения

Положение Фаулера пациент занимает:

лежа на боку с приведенными к груди ногами
промежуточное между положением лежа на животе и на боку
лежа горизонтально на спине, без подушки, с приподнятыми ногами
*лежа на спине с приподнятым изголовьем кровати под углом 45°С-60°С

Искусственное прерывание беременности по желанию женщины проводится:

на сроке до 6 недель
независимо от срока беременности
*на сроке до 12 недель
до 22 недель

При приступе бронхиальной астмы у ребенка медицинская сестра рекомендует проведение ванн:

воздушных
общей горячей
лечебной с морской солью
*горячих ручных и ножных

Обследования, которые проводят в поликлинике здоровому ребенку в возрасте 3-х месяцев:

*клинический анализ крови и общий анализ мочи
анализ мочи и по Нечипоренко и общий анализ крови
клинический анализ крови и определение фракций холестерина в сыворотке крови
тест толерантности к глюкозе и общий анализ мочи

Шок при инфаркте миокарда:

травматический
гемотранфузионный
анафилактический
*кардиогенный

Распределение пострадавших на группы для принятия решения об оказании медицинской помощи на данном этапе – это:

эвакотранспортная сортировка
диагностика и лечение
*внутрипунктовая сортировка
эвакуация

У взрослых к первому этапу СЛР относится:

контроль показателей кровообращения
*проведение закрытого массажа сердца
проведение искусственной вентиляции легких
обеспечение проходимости верхних дыхательных путей

Вдыхание пыли растений приводит к развитию аллергической реакции немедленного типа в виде:

контактного дерматита
гранулематозного воспаления
*сенной лихорадки (поллиноза)
гемолитической анемии

Пациент с острым отравлением госпитализируется:

*во всех случаях при тяжелой форме
для промывания желудка
в удовлетворительном состоянии
для периодического наблюдения

После выписки или смерти пациента проводят дезинфекцию:

текущую
*заключительную
профилактическую
предварительную

Гигиеническая обработка пациентов в условиях стационара (при отсутствии медицинских противопоказаний) должна осуществляться:

ежедневно
не реже 1 раза в 3 дня
не чаще 1 раза в 2 дня
*не реже 1 раза в 7 дней

В случае получения работником при обращении с медицинскими отходами травмы, потенциально опасной в плане инфицирования, необходимо:

обратиться в Управление Роспотребнадзора
*составить акт о несчастном случае на производстве установленной формы
составить протокол о несчастном случае на производстве произвольной формы
обратиться к врачу

Инвентаризация имущества проводится по:

документации, представленной материально-ответственным лицом
его местонахождению, допускается без присутствия материально-ответственного лица
*его местонахождению в присутствии материально-ответственного лица
документации в присутствии руководителя медицинской организации

Неоказание медицинской помощи без уважительной причины человеку, нуждающемуся в ней – это:

*преступление
взяточничество
должностной подлог
злоупотребление служебным положением

Порция "В" при дуоденальном зондировании – это:

содержимое 12 перстной кишки
*содержимое желчного пузыря
желчь из печёночных протоков
содержимое желудка

Теория сестринского дела отражает его философию, практику и задачи:

всех периодов сестринского дела

всей истории страны

всех периодов медицины

*на определенном этапе времени

Частота компрессий грудной клетки при СЛР у взрослых составляет (в минуту):

40-50

20-30

130-150

*100-120

При подозрении на дифтерию необходимо:

наблюдение и лечение на дому

сообщить врачу

*подать экстренное извещение в Роспотребнадзор

ввести противодифтерийную сыворотку

При резком открывании вентиля кислородного баллона создается опасность:

взрыва

падения баллона

пожара

*воспламенения деталей редуктора

К инвазивным процедурам относится:

пассивное кормление пациента

подготовка пациента к исследованию

проведение мероприятий по личной гигиене тяжелобольных

*проведение в/м, в/в, п/к, инъекций

Медицинская сестра процедурного кабинета заполняет:

*журнал учета работы бактерицидной лампы

журнал отказа от госпитализации

журнал учета санпросвет работы

журнал перевязок

Для профилактики опущения и выпадения влагалища женщинам рекомендуют воздержаться от:

беременности

*чрезмерных физических нагрузок, подъема тяжестей

приема мясной пищи

занятий физкультурой

Для профилактики застойной пневмонии у лежачих пациентов необходимо применять:

*перкуторный массаж

общий массаж

массаж головы

массаж конечностей

Искусственное прерывание беременности по социальным показаниям проводится:

*до 22 недель

на сроке до 12 недель

на сроке до 6 недель

независимо от срока беременности

Гипотрофия – это расстройство питания:

с превышением массы тела

без нарушений массы тела

с нормальной массой тела

*с дефицитом массы тела

Для постановки клизмы пациента укладывают на:

*левый бок
спину
правый бок
живот

Медицинские сестры и младший медицинский персонал по отношению к друг другу должны соблюдать принципы:

снисхождения
высокомерия
*взаимоуважения
грубости

Осуществление сестринского ухода на основе медицинского диагноза болезни под контролем врача – суть сестринского дела в теории:

*традиционной (медико-биологической)
ЕС Регионального бюро ВОЗ
Флоренс Найтингейл
Вирджинии Хендерсон

Санитарная обработка пациента, поступающего в стационар, проводится:

до регистрации пациента
*после врачебного осмотра
до врачебного осмотра
после регистрации пациента

При нахождении инородного предмета в ране необходимо:

извлечь его, далее контролировать кровотечение из раны
*не извлекать его из раны, наложить повязку вокруг него
извлечь его из раны
не предпринимать никаких действий, вызвать скорую медицинскую помощь

К развитию экспираторной одышки при приступе бронхиальной астмы приводит:

*спазм гладкой мускулатуры бронхов, отек слизистой оболочки бронхов и скопление вязкой мокроты
воспаление плевральных листков
отек гортани
повышение давления в малом круге кровообращения

Возбудители сепсиса новорожденного ребенка:

простейшие
*бактерии
вирусы
грибы

Приоритетная проблема пациента при экссудативном плеврите:

слабость
головная боль
*нарастающая одышка
снижение аппетита

Пострадавший с подозрением на сотрясение головного мозга госпитализируется в отделение:

хирургическое
интенсивной терапии и реанимации
*травматологическое или нейрохирургическое
реанимационное

Медицинский работник – это физическое лицо, которое работает в медицинской организации и:

*медицинская деятельность является его должностной обязанностью
обучает студентов в колледже
занимается просветительской деятельностью
имеет фармацевтическое образование

Организует и координирует работу медицинских сестер отделения (подразделения), находящихся в её подчинении:

младшая медсестра по уходу
палатная (постовая) медсестра
заведующий отделением
*старшая медицинская сестра

Для диагностики энтеробиоза перианальный соскоб направляют для исследования в лабораторию:

цитостатическую
*клиническую
бактериологическую
иммунологическую

При диффузно-токсическом зобе материал для исследования на содержание гормонов отправляется в лабораторию:

цитологическую
*биохимическую
клиническую
бактериологическую

Колоноскоп используется для осмотра слизистой оболочки:

тонкой кишки
мочевого пузыря
*толстой кишки
желудка

При попадании на кожу или слизистые цитостатика необходимо как можно скорее:

*промыть струей воды и зарегистрировать аварию
промыть спиртом
протереть влажной одноразовой салфеткой
промыть перманганатом калия

Независимое сестринское вмешательство в послеоперационном периоде:

назначение пациенту рациональной диеты
инъекции антибактериальных препаратов
*помощь пациентам в самообслуживании
смена дренажей

Рентгенологическое исследование почек и мочевыводящих путей с контрастированием называется:

томография
хромоцистоскопия
*экскреторная урография
ирригоскопия

Понятие «кумуляция» обозначает:

привыкание
зависимость
*накопление
повышенная чувствительность

Количество воды, необходимое для промывания желудка взрослому человеку:

7-8 литров
5-6 литров
3-4 литра
*10-12 литров

Источник инфекции при гриппе:

*больной человек
птицы-резервуар вируса
животные - резервуар вируса
реконвалесцент

Ожирению второй степени соответствует индекс массы тела:

18 кг/м²

*36 кг/м²

25 кг/м²

41 кг/м²

Причина возникновения поллинозного (сенного) конъюнктивита:

инфекция

травма

гиповитаминоз

*аллергия

Количество мочи при геморрагической лихорадке с почечным синдромом уменьшается в периоде:

реконвалесценции

полиурическом

лихорадочном

*олигурическом

Немодифицируемым фактором, способствующим развитию рака молочной железы, является:

употребление табака и алкоголя

несбалансированное питание

*половозрастная принадлежность

недостаточная физическая активность

Деятельность школ здоровья является формой проведения:

социальной профилактики

первичной профилактики

*вторичной профилактики

популяционной профилактики

Оценка физического развития детей проводится с помощью:

возрастных стандартов

индивидуальных стандартов

*центильных таблиц

визуально

К методам предупреждения возникновения болезней сердца относится:

трехразовое обильное питание, гиподинамия

*режим питания, умеренная физическая нагрузка, контроль массы тела

ограничение физической нагрузки, прием биодобавок

занятия с анаэробной физической нагрузкой

Основной задачей психопрофилактической подготовки беременной к родам является:

ознакомление с основами гигиены режима и питания беременных

ознакомление беременных со строением и функциями половых органов

*устранение психогенного компонента родовой боли

разъяснение влияния факторов внешней среды на течение беременности

В развитии артериальной гипертензии большое значение имеет:

*нарушение липидного обмена

длительное переохлаждение

очаг хронической инфекции

прием снотворных

«Поглаживание», «Растирание», «Вибрация», «Пиление» используются при проведении:

самовнушения

аутогенной тренировки

идеомоторной тренировки

*массажа

В случае нарушения прав пациента на охрану здоровья, он должен обращаться с жалобой:

только в администрацию медицинской организации

*в суд, этический комитет, в администрацию, лицензионную комиссию
только в суд
к главному врачу

Антисептикой называется:

уничтожение болезнетворных микробов

комплекс мероприятий, предупреждающих попадание микробов в рану

комплекс мероприятий по обеззараживанию помещений

*комплекс мероприятий, направленных на уничтожение микробов в ране, организме

Санитарно-противоэпидемическим режимом медицинской организации называется комплекс мероприятий, направленных на:

регулярный контроль выполнения требований асептики и антисептики

меры предосторожности при работе с пациентами в медицинских организациях

уничтожение болезнетворных микроорганизмов в окружающей среде

*предупреждение возникновения, распространения и ликвидацию инфекционных заболеваний, связанных с оказанием медицинской помощи

Цвет кислородных баллонов:

серый

черный

белый

*голубой

Признак желудочного кровотечения:

изжога

*рвота в виде кофейной гущи

рвота пищей, съеденной накануне

отрыжка

Признак острой массивной кровопотери:

гиперемия кожных покровов

повышение артериального давления

*слабый частый пульс

повышение температуры тела

При индексе шока (Альговер) равном 1.5, объем кровопотери составляет:

1,0 литр

*1,5 литра

0,5 литра

2,0 и более литра

Регургитацией называется:

*затекание жидкого желудочного содержимого по пищеводу в полость ротоглотки

вид носового кровотечения

гиперсаливация

затекание содержимого ротоглотки в трахею

Контроль за количеством выпитой и выделенной жидкости проводится для определения функции:

*почек

печени

селезенки

желудочно-кишечного тракта

Первое место в структуре инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, занимают:

кишечные инфекции

*гнойно-септические инфекции

инфекции кожных покровов

инфекции мочевыводящих путей

Эффект действия нитроглицерина наступает через:

20-25 минут

*1-2 минуты
15-20 минут
10-15 минут

Дезинфекция, проводимая в очаге после удаления из него источника инфекции:

очаговая
профилактическая
текущая
*заключительная

Преимущества централизованной стерилизации:

*высокая надежность стерилизации
высокий уровень ручного труда
большой объем инвестиций
хранение обработанных медицинских изделий на стерильных столах

При побочном действии вакцины заполняется:

*экстренное извещение
медицинская карта стационарного больного
карта здоровья
единый талон амбулаторного пациента

К фактору риска развития атеросклероза относится высокий уровень:

липопротеидов высокой плотности
*липопротеидов низкой плотности
креатинина
билирубина

Территория, на которой произошел выброс ядовитого вещества в окружающую среду и продолжается его испарение в атмосферу, называется:

территорией биологического заражения
зоной химического заражения
точкой радиационного заражения
*очагом химического заражения

Больному с рожистым воспалением кожи в фазе ремиссии рекомендуется проведение:

биохимического исследования крови
занятий лечебной физкультурой
консультации гомеопата
*бициллинотерапии

Ячейки противопрележного матраца заполнены:

водой
песком
ватой
*воздухом

К объективным методам обследования относится:

беседа с родственниками
*измерение давления
представление пациента о своем здоровье
выявление проблем пациента

Палатная санитарка обязана проводить влажную уборку палат в течение дежурства (рабочей смены) на реже:

*2 раз (утром и вечером)
3 раз (утром, днем, вечером)
раза (утром)
каждые 3 часа

Права и обязанности медицинских организаций и предпринимателей определяет:

Трудовой Кодекс РФ
Программа развития здравоохранения

*Федеральный Закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» 323-ФЗ
Гражданский Кодекс РФ

При подозрении на дифтерию мазок из зева и носа на ВЛ направляется в лабораторию:

*бактериологическую
клиническую
вирусологическую
биохимическую

При кормлении тяжелобольного пациента через зонд пищу подогревают до(°C):

*38-40
15-20
45-50
25-30

Цвет кожных покровов при гепатите А:

*желтушный
гиперемированный
бледный
цианотичный

Планированием семьи занимаются:

*центры планирования семьи
смотровые кабинеты поликлиник
родильные дома
врач-гинеколог участковый

Наиболее эффективная современная система делопроизводства в медицинских организациях предполагает использование:

пишущих машинок
ведение картотеки
*медицинских информационных систем (МИС)
прошнурованных журналов

Заболевание, не относящееся к группе кишечных инфекций:

*вирусный гепатит В
дизентерия
сальмонеллез
холера

Учащение пульса более 85 – 90 ударов в минуту, называется:

*тахикардией
брадикардией
асистолией
гипертонией

Ведущая причина геморрагического инсульта:

нерациональное питание
психо-эмоциональное перенапряжение
*атеросклероз сосудов головного мозга
избыточный вес

Причиной андропавзы является:

*снижение выработки тестостерона
избыток пролактина
снижение выработки эстрогена
снижение функции щитовидной железы

Двигательная активность при заболеваниях сердечно-сосудистой системы должна:

отсутствовать
уменьшаться
увеличиваться

*быть адекватной

К комбинированным вакцинам относится:

БЦЖ

*«Бубо-М»

коревая вакцина

паротитная вакцина

Увеличение ночного диуреза:

пиурия

дизурия

полиурия

*никтурия

Медико-административный карантин предусматривает:

дезинфекцию помещений

изоляция больного

*запрет въезда на неблагополучную территорию

осмотр прибывших из неблагополучных регионов

К проявлению климактерических признаков у женщины относится:

боль в животе

*нарушение менструального цикла

снижение аппетита

увеличение веса

Первая вакцинация АКДС, согласно календарю прививок, проводится в возрасте:

5 месяцев

6 месяцев

7 месяцев

*3 месяца

Воспаление гортани:

фарингит

*ларингит

эзофагит

тонзиллит

Дефицит йода в рационе питания детей приводит к:

заболеваниям поджелудочной железы

*повышению риска заболеваний щитовидной железы

повышению риска заболеваний надпочечников

повышенной заболеваемости острыми респираторными заболеваниями

Необходимы активные мероприятия по снижению уровней всех факторов риска, если суммарный сердечно-сосудистый риск SCORE:

высокий или низкий

умеренный

низкий

*умеренный, высокий и очень высокий

К трубчатым костям относится кость:

грудина

ребро

*лучевая

пяточная

При изменении технологического процесса, внедрении новых методик диагностики и лечения проводится инструктаж:

*внеплановый

первичный

повторный

вводный

Обязательное исследование при лейкозе:

УЗИ печени

биохимический анализ крови

пункция лимфоузла

*стерильная пункция

Соотношение количества выпитой и выделенной жидкости называется:

дневной диурез

анурез

*водный баланс

суточный диурез

Основной проблемой умирающего пациента является чаще всего:

нарушение сна

недостаточность общения

невозможность трудиться

*борьба с болью

Нестероидные противовоспалительные препараты вызывают:

анемию

*желудочно-кишечные кровотечения

снижение артериального давления

одышку

Свойство дезинфицирующего средства, обеспечивающее уничтожение бактерий:

фунгицидное

бактериостатическое

вирулицидное

*бактерицидное

Многоразовые медицинские изделия после инвазивных манипуляций подвергаются:

только стерилизации

*дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации

только дезинфекции

только предстерилизационной очистке

К методу стерилизации эндоскопической аппаратуры относится:

*химический

паровой

воздушный

физический

В помещениях медицинской организации влажную уборку проводят не реже:

*2-х раз в сутки

4-х раз в сутки

3-х раз в сутки

одного раза в сутки

В случае угрозы вашей безопасности при оказании первой помощи пострадавшему, необходимо:

*отойти на безопасное расстояние от пострадавшего, позвать на помощь

поговорить с пострадавшим властно

попытаться успокоить пострадавшего

постараться усмирить пострадавшего

Положение пациента в постели при острой сердечно-сосудистой недостаточности:

с приподнятым ножным концом кровати

горизонтальное, с приподнятой головой

*возвышенное, полусидя

горизонтальное

Характерный признак невралгии тройничного нерва:

рвота
ригидность затылочных мышц
отсутствие складок на лбу при поднимании бровей
*приступообразные боли на пораженной половине лица

При ветряной оспе везикулы на коже обрабатывают:

2% раствором перекиси водорода
5% спиртовым раствором йода
*2% спиртовым раствором бриллиантового зеленого
камфорным спиртом

При приеме препаратов нитрофуранового ряда рекомендуют:

ограничение молочных продуктов
*обильное питье
прием препарата до еды
прием витамина С

Человек признается недееспособным:

*решением суда
близкими родственниками
любым государственным органом
общественным мнением

Анатомическая область введения вакцины БЦЖ:

наружная поверхность предплечья
*граница верхней и средней трети наружной поверхности плеча
внутренняя поверхность предплечья
граница верхней и средней трети внутренней поверхности плеча

Решение о проведении вакцинации в детском возрасте должно приниматься:

медицинской сестрой на основе рекомендаций врача, согласно Национальному календарю профилактических прививок
врачом в соответствии с индивидуальным графиком профилактических прививок, независимо от наличия информированного согласия пациента
врачом в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, независимо от наличия информированного согласия законного представителя
*законным представителем пациента (для детей младше 15 лет) на основе информированного согласия (в письменном виде), после ознакомления с полезными эффектами и возможными рисками процедуры

Одышка -это:

*ощущение нехватки воздуха
удлинение выдоха
удлинение вдоха
укорочение вдоха

Показатель «ОХВАТ НАСЕЛЕНИЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЕЙ» отражает отношение:

*количества лиц, прошедших диспансеризацию, к общему числу лиц, подлежащих диспансеризации
числа зарегистрированных заболеваний к общему числу лиц с временной и стойкой нетрудоспособностью
числа зарегистрированных заболеваний к численности проживающего населения
численности населения, которому проведены необходимые исследования и осмотры врачей к числу зарегистрированных случаев заболеваний

К психоневротическим проявлениям климактерического синдрома относят:

жар
*плаксивость
нарушения сна
приливы

Ограничение действия канцерогенов является профилактикой заболеваний:

эндокринных
нервных

сердечно-сосудистых
*онкологических

Интенсивная физическая активность:

соответствует 30 тысячам шагов в сутки вне помещения
соответствует состоянию покоя в положении сидя или лежа
*значительно повышает частоту сердечных сокращений и вызывает появление пота и сильной одышки
оставляет ощущение тепла и легкой одышки

Схема вакцинации «0 – 1 – 6» применяется для вакцинации против:

*вирусного гепатита В
кори, ветряной оспы, краснухи
дифтерии, коклюша, столбняка
гриппа

Наиболее эффективными направлениями в комплексе лечебного воздействия на табакозависимость являются:

дыхательная гимнастика, фитотерапия
*психотерапия, заместительная терапия
физиотерапия, фармакотерапия
гелиотерапия, аэротерапия

Средство наглядного метода гигиенического воспитания:

дискуссия
лекция
*видеофильм
беседа

При желудочно-кишечном кровотечении пациента необходимо обеспечить:

внутримышечным введением викасола
внутривенным введением хлористого кальция
*пузырем со льдом на живот
введением анальгетиков

Специальные журналы учета операций, связанных с обращением лекарственных средств для медицинского применения:

подписаны заведующим отделением
*заверены печатью и подписью главного врача медицинской организации
заполнены в произвольной форме
подписаны постовой медицинской сестрой

К группе противовирусных лекарственных препаратов относится:

парацетамол
дроперидол
*ацикловир
протамина сульфат

Должностные преступления – это:

*злоупотребление служебным положением, халатность, должностной подлог
клевета
оставление в опасности
оскорбление

При органическом поражении головного мозга после перенесенного инсульта с нарушением памяти, внимания и речи применяют:

*циннаризин
феназепам
амитриптилин
гипотиазид

Ведущими признаками возникновения язвенной болезни являются:

*стресс, хеликобактерная инфекция
ОРВИ, переохлаждение

переохлаждение, переутомление
гиповитаминоз, переутомление

Основная причина острого гломерулонефрита:

микобактерии
кишечная палочка
кандидозная инфекция
*бета-гемолитический стрептококк группы А

К свойству дезинфицирующего средства, обеспечивающего уничтожение вирусов относится:

бактериостатическое
фунгицидное
бактерицидное
*вирулицидное

Причина развития терминального состояния:

*кровопотеря более 60% объема циркулирующей крови
хроническое заболевание желудка
стадия реконвалесценции вирусного гепатита В
компенсированный сахарный диабет

В случае отсрочки оказания первой помощи на время более 6 часов погибает пораженных:

10%
*90%
30%
60%

Для предупреждения высыхания роговицы пациенту в коме нужно:

проводить инфузионную терапию по назначению врача
*периодически закапывать в глаза изотонический раствор натрия хлорида
накладывать бинокулярную повязку
смазать веки солкосерилом

Действие эстрогенов на организм женщины проявляется в:

повышении уровня холестерина в крови
*развитии молочных желез
развитии мускулатуры
росте волос на лобке и в подмышечных впадинах

Для исследования удаленного клеща направление оформляют в лабораторию:

биохимическую
*микробиологическую
клиническую
бактериологическую

Внутримышечные инъекции выполняют в квадрант ягодицы:

нижненаружный
*верхненаружный
верхневнутренний
нижневнутренний

При гастродуоденальном кровотечении по назначению врача необходимо:

дать пузырь со льдом
ввести спазмолитики
*ввести дицинон, аминокaproновую кислоту
оказать помощь при рвоте

Длительность действия морфина составляет:

*4-6 часов
1-2 часа
8-10 часов
10-12 часов

Источниками инфекции при бешенстве являются:

утки, гуси
иксодовые клещи
полевые мыши
*собаки, лисы, кошки, волки

Противокашлевые препараты назначают при подготовке к исследованию:

*бронхоскопия
флюорография
рентгеноскопия
томография

Наложение гастростомы при неоперабельном раке пищевода является лечением:

*паллиативным
радикальным
симптоматическим
патогенетическим

Сыпной тиф характеризуется:

полиаденопатией
*наличием гепатолиенального синдрома
постепенным началом болезни
высокой лихорадкой длительностью до 7-10 дней

Основной симптом стенокардии:

*сжимающая, давящая боль
тошнота
слабость
одышка

Лечение анафилактических реакций включает использование всех препаратов, кроме:

хлоропирамина (супрастина)
преднизолон
*препаратов группы пенициллина
физиологического раствора

Предстерилизационная очистка использованных медицинских изделий многократного применения проводится с целью:

*удаления дезинфектантов, белковых, жировых, лекарственных и др. загрязнений
удаления лекарственных средств
дезинфекции
удаления белковых загрязнений

Гражданин имеет право на выбор участкового врача-терапевта не чаще, чем один раз в:

два года
четыре года
*один год
три года

Вербальная информация передается с помощью:

*речи
жестов
позы
взгляда

Тара, в которую собирается острый инструментарий (иглы, перья):

*одноразовый непрокальваемый контейнер с плотно прилегающей крышкой
одноразовый пакет желтого цвета
многократная емкость с плотно прилегающей крышкой
картонная коробка желтого цвета

К факторам биологической природы, воздействующим на медицинских работников в процессе их труда, относятся:

*вирусы и микроорганизмы

контроль за профессиональной деятельностью

рентгеновское, ультрафиолетовое, лазерное и ионизирующее излучение

пары химических веществ и лекарственных препаратов

Графические изображения в температурном листе пациента выполняет:

старшая медицинская сестра отделения

заведующий отделением

*медицинская сестра палатная (постовая)

процедурная медицинская сестра

При гангрене нижних конечностей пациента госпитализируют в отделение:

*хирургическое

эндокринологическое

нейро-сосудистое

терапевтическое

При гипертоническом кризе пожилому человеку медицинская сестра даст под язык:

клофелин

*капотен

анаприлин

коринфар

После проведения пациенту смены постельного и нательного белья медицинская сестра:

в устной форме сообщает о выполнении манипуляции лечащему врачу

не делает соответствующей записи в медицинскую документацию

*делает запись о результатах выполнения в медицинской документации

в устной форме сообщает о выполнении манипуляции сестре хозяйке

Критерием для отбора пациентов для оказания паллиативной помощи является:

ожидаемая продолжительность жизни не более 3-6 месяцев

*нулевой реабилитационный потенциал

ожидаемая продолжительность жизни не более года

ожидаемый эффект от применения новейших способов лечения

Диагностические критерии фактора риска «НИЗКАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ» - ходьба в умеренном или быстром темпе:

более 2 часов в день

*менее 30 минут в день

менее 20 минут в день

более 1 часа

Оказание специализированной кардиологической помощи проводится в:

реанимационном отделении

*кардиологическом центре

санатории

больнице скорой медицинской помощи

360. Путь передачи клещевого энцефалита:

*трансмиссивный

фекально-оральный

воздушно-капельный

половой

При измерении артериального давления систолическим давлением называется:

*показатель шкалы манометра при появлении первых звуков (тонов Короткова)

разница систолического и пульсового давления

сумма пульсового и систолического давления

величина, соответствующая полному исчезновению звуков (тонов Короткова)

Углублённое профилактическое консультирование проводится гражданам с группой здоровья:

*IIIa и IIIб

I и IIIa

I и IIIб

I и II

Субфебрильной температурой тела называется (в °C):

39-39,5

*37,1-38

38,1-38,2

38-38,5

«Золотым» стандартом кожных антисептиков являются:

водные

анионные

гелеобразные

*спиртовые

До начала инвентаризации основных средств рекомендуется проверить:

стоимость аппаратуры, наличие и состояние технических паспортов и другой технической документации

стоимость аппаратуры

*наличие описей, наличие и состояние технических паспортов и другой технической документации

наличие описей и стоимость аппаратуры

Ответственность за организацию безопасной рабочей среды несет:

пациент

профсоюз

работник

*работодатель

Высокий уровень ответственности медицинских работников за результаты своего труда часто являются причиной:

желания сменить профессию

посещения ближайшего учреждения культуры (театр, музей и т.п.)

ухода в отпуск

*постоянного напряжения и стресса

К паратрофии относятся состояния с избытком:

массы тела и роста более 10%

*массы тела более 10%

массы тела от 5 до 9%

массы тела более 2%

Международный День медицинской сестры празднуется

7 января

25 октября

17 июня

*12 мая

Внепеченочные признаки хронического гепатита:

лакированный язык

*сосудистые звездочки

узловая эритема

ногти в виде «часовых стекол», пальцы в виде «барабанных палочек»

Характеристика резаной раны:

края неровные, вокруг кровоизлияние

большая глубина, точечное входное отверстие

*края ровные, зияет

края неровные, зияет

Для восстановления речи у пациента с острым нарушением мозгового кровообращения необходимы занятия со специалистом:

*логопедом
врачом-неврологом
врачом-психиатром
психологом

По определению ВОЗ здоровье - это:

динамическая гармония личности с окружающей средой, достигнутая посредством адаптации, средство жизни
*состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней
состояние полного физического благополучия
отсутствие болезней

Длительное воздействие солнечных лучей – фактор риска возникновения:

болезней сердечно-сосудистой системы
болезней пищеварения
болезни выделительной системы
*злокачественных опухолей кожи

Утилизация медицинского мусора класса Б выполняется путем:

захоронения на территории больницы
складирования на хозяйственном дворе больницы
*сжигания в печах или захоронения на спец.полигонах
вывоза на городскую свалку бытового мусора

К устройствам для поднятия и перемещения больных относятся:

наколенники
удерживающие пояса
слайдеры
*слинги (гамаки)

Общий желчный проток открывается в кишку:

*двенадцатиперстную
тощую
сигмовидную
подвздошную

Места образования чрезвычайно опасных отходов класса В:

внекорпусные территории ЛПУ
операционные
медицинские и патологоанатомические лаборатории
*фтизиатрические и микологические клиники

В случае образования постинъекционного инфильтрата медицинская сестра должна:

*довести до сведения врача и сделать запись в журнал регистрации постинъекционных осложнений
проконсультироваться с хирургом и направить пациента на УВЧ-терапию
обработать инфильтрат 5% раствором йода
отменить последующие инъекции

Для эрадикационной терапии HP (HELICOBACTER PYLORI) пациенту назначают:

но-шпу (дротаверин), папаверин
платифиллин, атропин
*омепразол, кларитромицин, амоксициллин
альмагель, ранитидин

Для диагностики заболеваний щитовидной железы в крови определяют:

гемоглобин, цветовой показатель
инсулин, глюкагон
лейкоциты, СОЭ
*гормоны Т3, Т4, ТТГ

Меры, направленные на второе звено эпидемического процесса:

использование антибактериальных препаратов
изоляция больного
иммунизация
*дезинфекционные мероприятия

Для проведения йодной профилактики при загрязнении местности радиоактивными веществами препараты йода хранятся:

в подразделениях медицинской организации
*на аптечном складе региона
в больничной аптеке
на складе центральной аптеки

Основные вложения в комплект индивидуальный медицинский гражданской защиты для оказания первой помощи:

доксциклин амоксициллин + клавулановая кислота
карбоксим (антидот ФОС), шприц, салфетка антисептическая
калия йодид, калий-железо гексацианоферрат, ондансетрон
*воздуховод ротовой, жгут кровоостанавливающий, перевязочные средства, антисептические, противоожоговые и обезболивающие препараты

Уретральный катетер перед введением обрабатывают:

3% раствором перекиси водорода
70° этиловым спиртом
*стерильным глицерином
антисептическим раствором

К наиболее эффективной зоне общения медицинской сестры с пациентом, относится зона:

интимная
общественная
социальная
*комфорта

Образованию пролежней у пациента в положении лежа на спине наиболее подвержена зона:

височной области
область предплечья
*крестца
грудной клетки

Разглашение врачебной тайны возможно в случае:

*опасности распространения некоторых инфекционных заболеваний
по просьбе руководителя
некоторых генетических дефектов у одного из супругов
по просьбе близких родственников

При инфаркте миокарда боль купируется:

диуретиками
бета-блокаторами
статинами
*наркотическими анальгетиками

Показания к использованию медицинских перчаток:

*асептические процедуры, контакты с кровью и другими биологическими жидкостями
беседа с пациентом
работа с паровыми стерилизаторами
работа с воздушными стерилизаторами

Повышать квалификацию медицинская сестра должна:

по потребности, ею определяемой
*в течение всей профессиональной жизни
по мере необходимости, определяемой руководством
при выявлении нарушений ею технологии

Дисбактериоз – это:

*нарушение количественного и качественного состава микрофлоры
инфекционное заболевание
полное отсутствие микрофлоры
внутрибольничная инфекция

Анализ мочи по Нечипоренко проводится для определения в единице объема:

белка, глюкозы
ацетона, глюкозы
*лейкоцитов, эритроцитов
солей, билирубина

При приеме гериатрическими пациентами В-блокаторов, медсестра контролирует:

суточный диурез
массу тела
состояние полости рта
*артериальное давление, пульс

При хроническом гастрите из рациона исключают:

молочные продукты
отварные овощи
кашу
*жирную, жареную пищу

Пикфлоуметрией называется метод, позволяющий измерить:

объем форсированного выдоха за 1 секунду
содержание кислорода в выдыхаемом воздухе
*пиковую скорость выдоха
жизненную емкость легких

Количество периодов в развитии лихорадки:

*3
4
2
5

Использованные ампулы, шприцы и иглы после цитостатиков необходимо:

*собрать в контейнер, запечатать, промаркировать и отправить на сжигание
собрать в емкость и отправить в мусоросборник
залить дезинфектантом
выбросить в мусорный бак

Появление у лихорадящего пациента резкой слабости, обильного холодного пота, бледности кожных покровов, нитевидного пульса и снижение АД наиболее вероятно при:

*критическом снижении температуры
субфебрилитете
быстром и значительном повышении температуры
литическом снижении высокой температуры

Основным признаком первого периода лихорадки является:

жажда
*озноб
рвота
чувство жара